



JURNAL APLIKASI TEKNOLOGI PANGAN

pISSN 2089-7693 • eISSN 2460-5921

A publication



[HOME](#) [ABOUT](#) [PEOPLE](#) [ISSUE](#) [SUBMISSIONS](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [LOGIN](#)

RECENT NEWS [Cara Upload File Revisi](#)

Current issue: Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 | Archives

Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan or JATP (pISSN 2089-7693, eISSN 2460-5921) is a quarterly scientific food journal (February, May, August, and November) which is accredited (TERAKREDITASI) by Kemenristekdikti.

This website is an update of JATP previous website: <http://jatp.ift.or.id>. All archives until 2017 were stored at those URL. Starting from 2018, JATP officially migrates to <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jatp>

Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan aims to expose the results of fundamental and applied research in food and its related fields to scholars, students, and food applicants. The journal covers the fields of application of technology on food, i.e. biotechnology, functional food, food process, health, food related field on agribusiness and agro-technology.

Journal Indexing:

1. DOAJ (<https://doaj.org/toc/2460-5921>)
2. Sinta (<http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?id=1070>)
3. Google Scholar (<https://scholar.google.co.id/citations?user=2YFp9SAAAAAJ&hl=en>)
4. Onesearch (<http://onesearch.id/Record/I054820.ai:oms-106612>)
5. LIPI (<http://u.lipi.go.id/1437958589>)
6. Inasti LIPI (http://inasti.lipi.go.id/inasti/inasti/production/impact_factor2a.php)
7. OCLC WoIrdcat (<http://www.worldcat.org/oclc/7374939229>)

Official Address:

Gedung B Lantai 3 Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Kampus Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275,
Tel./faks. (024) 7474750
Email: redaksi@ift.or.id,
Web: www.ift.or.id
Whatsaop: +62 823 2949 7430

User

Username

Password

Remember me

[Login](#)

Journal Content


Search

Search Scope

[Search](#)

Browse


- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)



JURNAL APLIKASI TEKNOLOGI PANGAN

pISSN 2089-7693 • eISSN 2460-5921

A publication



[HOME](#) [ABOUT](#) [PEOPLE](#) [ISSUE](#) [SUBMISSIONS](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [LOGIN](#)

People > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Chief Editor

Ahmad Ni'matullah Al-Baari, PhD. (ScopusID: 57194592890)
Food Technology Department, Faculty of Animal and Agricultural Sciences, Diponegoro University, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia

Editorial Board

Dr. Yoyok Budi Pramono (ScopusID: 56177694300)
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Dr. Mulyana Hadipernata
Badan Litbang Pasca Panen, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, Indonesia

Dr. Juni Sumarmono
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Dr. Alberta Rika Pratiwi
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Indonesia

Dr. Heni Rizqiyati
Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Indonesia

User

Username

Password

Remember me

[Login](#)

Journal Content

Search

Search Scope

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jatp/issue/view/266 80% anis (Cinnamomum sp)

Jurnal pangan nasional "terakreditasi" Kemeristekdikti dari Indonesian Food Technologists® - IFT

JURNAL APLIKASI TEKNOLOGI PANGAN

pISSN 2089-7693 • eISSN 2460-5921

A publication

IFT Indonesian Food Technologists®

HOME ABOUT PEOPLE ISSUE SUBMISSIONS ANNOUNCEMENTS LOGIN

Home / Archives / Vol 7, No 3 (2018)

Vol 7, No 3 (2018): Agustus 2018

Table of Contents

Catatan Penelitian (Research Note)

Pengaruh Steam Blanching terhadap Aktivitas Polifenol Oksidase, Total Polifenol dan Aktivitas Antioksidan Biji Kakao PDF
Nurhayati Nurhayati, Djagal Wiseso Marseno, FMC Sigit Setyabudi, Supriyanto Supriyanto
Views: 191 | Language: ID | DOI: 10.17728/jatp.2314
Received: 2 Mar 2018; Published: 23 Oct 2018.

Potensi Usaha Mie Bayam sebagai Diversifikasi Produk Mie Sehat PDF
Siswanto Imam Santoso, Siti Susanti, Heni Risqiati, Agus Setiadi, Suryani Nurfadillah
Views: 146 | Language: IND | DOI: 10.17728/jatp.2690
Received: 25 May 2018; Published: 29 Aug 2018.

Pemanfaatan Limbah Padat Industri Tahu sebagai Co-Subtrat untuk Produksi Biogas Utilization of Tofu Cake as Co-Substrate in Biogas Production PDF
Fredynanta Saputra, Sutaryo Sutaryo, Agung Purnomoadi
Views: 75 | Language: EN | DOI: 10.17728/jatp.2315
Received: 2 Mar 2018; Published: 27 Aug 2018.

Artikel Penelitian (Research Article)

Karakteristik Fisik dan Kimia Tepung Malt Gabah Beras Merah dan Malt Beras Merah dengan Perlakuan Malting pada Lama Germinasi yang Berbeda PDF
Yasmin Aulia Rachma, Dina Yulia Anggraeni, Lita Lusiana Surja, Siti Susanti, Yoga Pratama
Views: 328 | Language: EN | DOI: 10.17728/jatp.2707
Received: 4 Jun 2018; Published: 23 Aug 2018.

Ekstraksi Teh Putih Berbantu Ultrasonik pada Berbagai Amplitudo PDF
Asri Widyasanti, Tri Halimah, Dadan Rohdiana
Views: 206 | Language: EN | DOI: 10.17728/jatp.2295
Received: 27 Feb 2018; Published: 23 Aug 2018.

Perubahan Aktivitas Antioksidan dan Total Mikroba Salak Pondoh Selama Penyimpanan dengan Asam Hypoiodous (HIO) PDF
Wildan Alfira Gusrianto, Siti Fatimah-Muis, Ahmad Ni'matullah Al-Baari, Anang Mohamad Legowo
Views: 160 | Language: ID | DOI: 10.17728/jatp.2874
Received: 30 Jun 2018; Published: 30 Aug 2018.

Respon Glikemik dan Aktivitas Antioksidan Nasi Yang Dimasak Menggunakan Campuran Kunyit (Curcuma longa Linn.) dan kayu Manis (Cinnamomum sp) PDF
Samsu Udayana Nurdin, Yofita Sulfiana Sundari, Novita Herdiana, Fibra Nurainy, Asep Sukohar
Views: 114 | Language: EN | DOI: 10.17728/jatp.2681
Received: 24 May 2018; Published: 30 Aug 2018.

Potensi Yogurt Rosella Probiotik Lactobacillus plantarum IIA-1A5 atau Lactobacillus fermentum B111K dalam Mengasimilasi Kolesterol PDF
Asti Yosela Oktaviana, Irma Isnafia Arief, Irmanida Batubara
Views: 334 | Language: EN | DOI: 10.17728/jatp.2760
Received: 8 Jun 2018; Published: 30 Aug 2018.

Issue Coverage (32 Authors)

Total 1 Author's Country

Indonesia	(32)
-----------	------

Total 8 Author's Affiliations

Bandar Lampung	(5)
Bogor	(3)
Jatinangor	(2)
Kabupaten Bandung	(1)
Mataram	(1)
Semarang	(12)
Universitas Diponegoro	(5)
Yogyakarta	(3)

User

Username [Activate](#)
Password [Go to Sett](#)

Remember me

Journal Content

Search

Search Scope

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

Artikel Penelitian

Respon Glikemik dan Aktivitas Antioksidan Nasi Yang Dimasak Menggunakan Campuran Kunyit (*Curcuma longa* Linn.) dan Kayu Manis (*Cinnamomum* sp)

Glycemic Response and Antioxidant Activity of Rice Cooked with Combination of Turmeric (Curcuma longa Linn.) and Cinnamon (Cinnamomum sp).

Samsu Udayana Nurdin^{1,2*}, Yofita Sulfiana Sundari¹, Novita Herdiana¹, Fibra Nurainy¹, Asep Sukohar³

¹Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Kesehatan dan Herbal Universitas Lampung, Bandar Lampung

³Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Bandar Lampung *Korespondensi dengan penulis (samsu.udayana@fp.unila.ac.id).

Artikel ini dikirim pada tanggal 24 Mei 2018 dan dinyatakan diterima tanggal 30 Agustus 2018. Artikel ini juga dipublikasi secara online melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jatp>. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperbanyak untuk tujuan komersial. Diproduksi oleh Indonesian Food Technologists©2018

Abstrak

Penurunan daya cerna pati nasi merupakan cara yang menjanjikan untuk menurunkan efek hiperglikemia nasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kunyit (*Curcuma longa* Linn) dan kayu manis (*Cinnamomum* sp) dapat menurunkan daya cerna pati karena kandungan senyawa penoliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah kunyit, kayu manis atau kombinasinya memiliki kemampuan untuk menurunkan daya cerna pati atau meningkatkan aktivitas antioksidan nasi putih. Kombinasi 3 dan 0 g (C1), 2 dan 1 g (C2), 1 dan 2 g (C3), atau 0 dan 3 g (C4) masing-masing untuk kunyit dan kayu manis digunakan untuk memasak nasi putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kunyit dan kayu manis untuk memasak nasi tidak mempengaruhi daya cerna pati, aktivitas antioksidan, dan kadar total penolik nasi tetapi mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap nasi. Formula terbaik adalah kombinasi antara 2 g kunyit dan 1 g kayu manis (C2) dimana nasi yang dimasak dengan tambahan campuran ini memiliki karakteristik sebagai berikut: tingkat hidrolisis pati 3,99 kali, aktivitas antioksidan 42,03%, kadar total penol 117,18 ppm (GAE), dan oleh konsumen dianggap layak sebagai makanan pokok. Kesimpulannya adalah nasi yang dimasak dengan formula C2 memiliki respon glikemik yang tidak berbeda dengan nasi biasa.

Kata kunci: Kunyit; kayu manis; respon glikemik; penol; daya cerna pati.

Abstract

Reducing of starch digestibility of the rice is one of promising strategies to reduce hyperglycemic effect of the rice. Some research indicate turmeric (Curcuma longa Linn) and cinnamon (Cinnamomum sp) reduced starch digestibility due to their phenolic content. This research was aimed to study whether turmeric, cinnamon and their combination have potentiality to reduce starch digestibility or increase antioxidant activity of white rice. Combination of 3 and 0 g (C1), 2 and 1 g (C2), 1 and 2 g (C3), 0 and 3 g (C4) turmeric and cinnamon were used for cooking white rice. The results showed that the addition of turmeric and cinnamon for cooking of rice had no effect on the level of starch hydrolysis, antioxidant activity and phenolic content of rice but significantly affected the consumer acceptance of the rice. The best formula was combination of 2 g of turmeric and 1 g of cinnamon (C2) where the rice cooked by adding this formula had characteristics as follows= starch hydrolysis level was 3.989 fold, antioxidant activity was 42.03%, total phenol was 117.18 ppm (GAE). Consumers considered that the rice was suitable for staple food. However, no difference on the glycemic respons was found. As conclusion, addition of turmeric, cinnamon or their combination for cooking of rice was unable to decrease starch digestibility and increase antioxidant activity of the rice.

Keyword : turmeric, cinnamon, glycemic response, phenol, starch digestibility

Pendahuluan

Pada penderita diabetes, homeostasis gula darah terganggu disebabkan ketidakmampuan tubuh menjaga kadar gula darah karena produksi insulin yang rendah atau inefisiensi kerja insulin. Akibatnya glukosa yang berasal dari makanan lambat digunakan dan kadarnya terus meningkat dalam darah seiring dengan meningkatnya asupan (Anderson *et al.*, 2006). Membatasi konsumsi pangan sumber glukosa merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan penyakit diabetes. Pembatasan ini memerlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan sering

menyulitkan penderita sehingga sering mengalami kegagalan perawatan (Dyson, 2015).

Nasi merupakan makanan yang memberikan kontribusi penting pada terjadinya penyakit diabetes (Hu *et al.*, 2013). Nasi mengandung pati yang tinggi yang melalui proses pencernaan akan diserap tubuh dalam bentuk glukosa. Karena itu konsumsi nasi dalam jumlah banyak dan jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes (Riccardi *et al.*, 2005; Hu *et al.*, 2013). Bahkan pada penderita diabetes asupan nasi harus terkontrol dengan memperhatikan jumlah dan waktu konsumsi (Dyson, 2015).

Modifikasi pati pada nasi dapat menghasilkan pati resisten yang tidak terhidrolisis selama proses pencernaan. Senyawa penol adalah satu zat yang dapat bereaksi dengan pati yang menyebabkan penurunan daya cerna pati (Zhu, 2015). Selain dengan pati, senyawa penol juga dapat bereaksi dengan protein membentuk senyawa yang lebih kompleks (PerezGregorio dan Simal-Gandara, 2017). Karena enzim yang terlibat pada pencernaan pati tersusun dari protein maka diduga senyawa penol juga dapat mengganggu aktivitas enzim-enzim tersebut. Selain itu beberapa senyawa penolik bersifat sebagai antioksidan yang diduga dapat berperan penting pada pencegahan perkembangan dan komplikasi diabetes (Ghosh *et al.*, 2018; Polce *et al.*, 2018).

Kayu manis dan kunyit kaya akan senyawa penolik dan diketahui memiliki efek penghambatan terhadap kerja enzim glukosidase dan memiliki aktivitas antioksidan (Zheng *et al.*, 2018; Wojcik *et al.*, 2018; Talaei *et al.*, 2017). Kedua jenis rempah-rempah ini telah sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bumbu memasak nasi. Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan campuran kunyit dan kayu manis dapat menurunkan daya cerna pati dan meningkatkan aktivitas antioksidan nasi yang dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membuka pengetahuan pada masyarakat mengenai upaya penurunan daya cerna dan peningkatan aktivitas antioksidan pada nasi.

Materi dan Metode

Materi

Bahan utama yang digunakan yaitu kunyit dan kayu manis yang diperoleh di pasar tradisional Jatimulyo, Lampung Selatan dan beras dengan varietas Ciherang yang berasal dari daerah Lampung Timur. Untuk menentukan tingkat hidrolisis pati digunakan enzim α -amilase dari *Aspergillus Oryzae* (Sigma Aldrich, US). Bahan yang digunakan untuk analisis antara lain Dinitro Salisilat (DNS) (Sigma Aldrich, US), Na- metabisulfit (Merck KGaA, Jerman), NaOH (Merck KGaA, Jerman), Kalsium Natrium Tartrat Tetrahidrat (Sigma Aldrich, US), fenol, folin ciocalteu (Merck KGaA, Jerman), Natrium Karbonat (Na_2CO_3) (Merck KGaA, Jerman), ethanol absolute (Merck KGaA, Jerman), DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) (Yunphos, China), dan kertas saring.

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain *rice cooker* (Maspion), loyang, blender merk Miyako, neraca analitik, oven, ayakan (Endecotts Ltd., UK), *spectrophotometer blood glucose test meter* (ACCU CHEK Active, Australia).

Metode

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan untuk mencari formula campuran kunyit dan kayu manis yang dapat menurunkan derajat hidrolisis pati dan meningkatkan aktivitas antioksidan nasi secara optimal dan nasi yang dihasilkan layak untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Selanjutnya formula terbaik dengan kriteria tersebut digunakan untuk memasak nasi dan nasi yang dihasilkan diuji respon

glikemiknya dan dibandingkan dengan nasi biasa (Tahap kedua).

Penelitian pertama menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) non faktorial dengan tiga kali ulangan. Penelitian ini dilakukan dengan lima perlakuan yaitu formula yang terdiri dari bubuk kunyit 3 g (C1), kombinasi bubuk kunyit 2 g dengan bubuk kayu manis 1 g (C2), kombinasi kunyit 1 g dengan bubuk kayu manis 2 g (C3), bubuk kayu manis 3 g (C4) dan kontrol yaitu tanpa menggunakan kunyit atau kayu manis (C5). Pada penelitian kedua, nasi terbaik dari penelitian pertama dibandingkan dengan nasi biasa atau kontrol dengan cara diujikan pada 10 orang responden sehat. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor 1974/UN26/8/DL/2017.

Persiapan Bahan untuk Formulasi Campuran Herbal

Pengeringan kunyit diawali dengan pemilihan rimpang kunyit yang tua dan segar. Kunyit dicuci hingga bersih dan kemudian diiris tipis-tipis. Kunyit dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 40°C selama dua hari, sedangkan untuk kayu manis tidak dikeringkan karena sudah tersedia dalam bentuk kering. Kunyit dan kayu manis selanjutnya dihancurkan menggunakan blender sehingga diperoleh serbuk kering kunyit dan kayu manis yang kasar (tidak halus), kemudian diayak untuk menyeragamkan ukurannya yaitu serbuk lolos ayakan 10 mesh tapi tidak lolos ayakan 20 mesh. Serbuk rempah selanjutnya dicampurkan sesuai dengan perlakuan dengan berat total 3 g dan dimasukkan ke dalam kantong kertas saring yang dipotong dengan ukuran seragam. Kantong yang telah diisi dengan campuran rempah kemudian ditutup menggunakan *sealer*.

Pemasakan Nasi

Pemasakan nasi dilakukan dengan menggunakan *rice cooker*. Air sebanyak 400 ml dimasukkan kedalam *rice cooker* dan ditunggu hingga mendidih, kemudian kantong berisi rempah dimasukkan kedalam *rice cooker*, setelah 5 menit kemudian dimasukkan beras sebanyak 200 g yang telah dicuci. Pemasakan selesai jika *rice cooker* menunjukkan bahwa pemasakkan telah selesai.

Pengamatan

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah derajat hidrolisis (daya cerna) pati (Muchtadi *et al.*, 1989), aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, serta total fenol (Ismail *et al.*, 2012). Penerimaan konsumen terhadap nasi yang dihasilkan diuji menggunakan metode *central location test* (Resurreccion, 1998) pada 5 lokasi yang berbeda dengan melibatkan 119 panelis yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Lampung. Selanjutnya nasi yang memiliki daya cerna pati terendah dan aktivitas antioksidan tertinggi serta paling dianggap layak sebagai makanan pokok oleh konsumen diuji respon glikemiknya pada responden yang sehat.

Pengukuran Respon Glikemik

Pengukuran respon glikemik diawali dengan tahap seleksi calon responden. Calon responden adalah mahasiswa Universitas Lampung berjumlah 10 orang, laki-laki dan perempuan, berumur 18-25 tahun, memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) normal antara 18,5-22,9 kg/m² dan dalam keadaan sehat, tidak merokok dan meminum minuman beralkohol, dan tidak memiliki riwayat diabetes. Pengukuran respon glikemik nasi dengan menggunakan metode EI (1999). Dalam tahap ini sebelum pengukuran respon glikemik responden diminta menjalani puasa penuh (*overnight fasting*), kecuali air minum selama 10 jam. Sebelum pemberian pangan uji, kadar glukosa darah responden diuji untuk mengetahui kadar gula puasa. Kemudian responden diminta mengkonsumsi pangan uji dengan kandungan karbohidrat sebanyak 40 g dengan memperhitungkan kadar air yang terkandung pada bahan. Selanjutnya sampel darah responden diambil kembali pada menit ke30, 60, 90, dan 120 setelah responden selesai makan pangan uji. Pengukuran glukosa darah menggunakan *glucose meter*. Selama pengambilan darah berlangsung, responden bersifat santai dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Pemberian pangan uji dilakukan dengan jeda empat hari untuk masing-masing pangan. Kadar glukosa darah (setiap waktu pengambilan darah) yang telah diperoleh kemudian dirata-rata dari seluruh responden. Kadar glukosa darah yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk grafik antara kadar gula (sumbu Y) dan waktu pengambilan darah (sumbu X). Respon glikemik nasi ditentukan dengan menghitung luas area dibawah kurva. Respon glikemik didefinisikan sebagai luas area di bawah kurva kadar gula darah setelah mengonsumsi nasi setara 40 g karbohidrat.

Analisis Statistik


Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) untuk mendapatkan penduga ragam galat dan perbedaan antar perlakuan. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, data di uji lebih lanjut dengan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 1 dan 5%.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Hidrolisis Pati Nasi


Nasi merupakan bahan pokok yang memiliki kandungan pati yang tinggi. Sebagai makanan pokok, nasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan gula darah sehingga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit diabetes (Hu *et al.*, 2013). Penurunan daya cerna pati nasi merupakan alternatif penting yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hiperglikemia. Penurunan ini dapat dilakukan dengan cara memodifikasi pati sehingga tidak dikenali oleh enzim pencernaan atau menghambat kerja enzim yang terlibat pada pencernaan pati. Berbagai komponen bioaktif tanaman diketahui dapat bereaksi dengan pati sehingga menjadi resisten terhadap pencernaan atau menghambat kerja enzim pencernaan sehingga enzim tersebut gagal mencerna pati (Zhu, 2015).

Pada penelitian ini, penggunaan campuran kunyit dan kayu manis pada proses pemasakan nasi tidak dapat menurunkan daya cerna pati nasi (Figur 1). Kadar gula yang dibebaskan setelah tepung nasi yang dimasak dengan campuran herbal (C1, C2, C3 dan C4) diinkubasi dengan enzim alfa amilase selama 60 menit tidak berbeda nyata dengan tepung nasi biasa (C5). Diduga kadar senyawa bioaktif khususnya senyawa fenolik yang terekstrak dari campuran kunyit dan kayu manis kadarnya terlalu rendah untuk dapat menghambat aktivitas enzim alfa amilase (Marmouzi *et al.*, 2017).




Figur 1. Pengaruh perlakuan terhadap tingkat hidrolisis pati nasi yang diinkubasi selama 60 menit. Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. C1 = 3 g kunyit dan 0 g kayu manis; C2 = 2 g kunyit dan 1 g kayu manis; C3 = 1 g kunyit dan 2 gram kayu manis; C4 = 0 g kunyit dan 3 g kayu manis; C5 = kontrol


Pada pengujian tingkat hidrolisis pati ini digunakan satu jenis enzim yaitu alpha amilase. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat penghambatan senyawa fenolik terhadap enzim alpha amilase tergantung pada dosis dan sumber senyawa fenolik yang digunakan (Kalita *et al.*, 2018; Marmouzi *et al.*, 2017; Gondi dan Prasada, 2015). Senyawa fenolik dari Moroccan Oat memiliki IC₅₀ terhadap enzim alpha amilase antara 723,1 hingga 1027,14 ppm, tergantung pada varietasnya (Marmouzi *et al.*, 2017). Sementara itu, senyawa fenolik dari kentang dan kulit mangga memiliki IC₅₀ terhadap enzim alpha amilase yang jauh lebih rendah yaitu masing-masing 25 ppm (Kalita *et al.*, 2018) dan 4,0 ppm (Gondi dan Prasada, 2015). Pada penelitian ini, untuk menghidrolisis pati nasi menggunakan enzim alpha amilase, nasi kering dicampurkan dengan buffer pospat yang mengandung enzim dengan perbandingan 1 dan 9. Karena kandungan senyawa fenolik nasi berkisar antara 99,41(C5) hingga 119,03 ppm (C4) (Figur 4), maka setelah dicampurkan dengan buffer pospat yang mengandung enzim maka konsentrasi total polnya berkisar antara 9,94 hingga 11,90 ppm. Konsentrasi senyawa fenolik pada nasi akibat penambahan campuran kunyit dan kayu manis ini diduga belum mampu meningkatkan penghambatan kerja enzim alfa amilase yang digunakan untuk menghidrolisis pati nasi.



Figur 2. Pengaruh perlakuan terhadap aktivitas antioksidan nasi. Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5% . C1 = 3 g kunyit dan 0 g kayu manis; C2 = 2 g kunyit dan 1 g kayu manis; C3 = 1 g kunyit dan 2 gram kayu manis; C4 = 0 g kunyit dan 3 g kayu manis; C5 = kontrol



Figur 3. Pengaruh perlakuan terhadap total fenol nasi. Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5% . C1 = 3 g kunyit dan 0 g kayu manis; C2 = 2 g kunyit dan 1 g kayu manis; C3 = 1 g kunyit dan 2 gram kayu manis; C4 = 0 g kunyit dan 3 g kayu manis; C5 = kontrol



Figur 4. Pengaruh komposisi rempah yang digunakan dalam pemasakan nasi terhadap peringkat kelayakan menurut panelis. Nilai tengah yang diikuti dengan huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 5%. C1 = 3 gram kunyit, 0 gram kayu manis; C2 = 2 gram kunyit, 1 gram kayu manis; C3 = 1 gram kunyit, 2 gram kayu manis; C4 = 0 gram kunyit, 3 gram kayu manis; C5 = Control

Aktivitas Antioksidan Nasi

Sebagaimana pengaruh terhadap tingkat hidrolisis pati nasi, penambahan campuran kunyit dan kayu manis juga tidak dapat meningkatkan aktivitas antioksidan nasi yang dihasilkan (Figur 2). Aktivitas antioksidan nasi biasa (kontrol) atau yang dimasak dengan penambahan kunyit dan kayu manis berkisar antara 40,046% (C5) hingga 47,047% (C1). Hasil ini juga merupakan bukti bahwa nasi biasa juga mengandung antioksidan sebagaimana telah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya (Walter dan Marchesan, 2011; Goufo dan Tridande, 2014; Shao *et al.*, 2014).

Senyawa penolik memberikan kontribusi penting pada kapasitas antioksidan nasi/beras (Ye *et al.*, 2016; Jun *et al.*, 2015; Shao *et al.*, 2014). Hubungan yang kuat antara kadar total penol dengan aktivitas antioksidan ditemukan pada beras hitam dimana pada beras ini asam ferulat diketahui sebagai senyawa fenolik yang utama (Jun *et al.*, 2015). Beras putih memiliki kadar total fenol yang lebih rendah dibandingkan dengan beras merah dan aktivitas antioksidan beras tersebut berbanding lurus dengan kadar total fenolnya (Shao *et al.*, 2014). Pada penelitian ini, peningkatan kadar total fenol nasi akibat penambahan campuran kunyit atau kayu manis yang tidak signifikan (Figur 3) diduga menjadi penyebab mengapa aktivitas antioksidan nasi yang dimasak dengan campuran kunyit dan kayu manis tidak berbeda dengan nasi biasa.

Total Fenol Nasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa campuran kunyit dan kayu manis tidak berpengaruh nyata terhadap total fenol nasi. Total fenol nasi yang dimasak tanpa atau dengan penambahan campuran kunyit dan kayu manis berkisar antara 99,419 (C5) hingga 119,031 (C4) ppm (GAE) (Figur 3). Penggunaan campuran kunyit dan kayu manis pada pemasakan nasi hanya meningkatkan kadar total penol nasi maksimal sebesar 19,1 ppm, yaitu pada nasi yang dimasak dengan penambahan 3 g kayu manis (C4).

Kandungan senyawa penolik pada beras tergantung pada varietas padinya (Tian *et al.*, 2004; Goufo dan Tridande, 2014; Shao *et al.*, 2014). Kadar total penol beras putih berkisar antara 14,6-33,4 ppm, beras merah 66,8-422,2 ppm, dan beras hitam antara 56,8-82,0 ppm (Shao *et al.*, 2014). Pemasakan dapat menyebabkan penurunan kadar total penolik beras dan juga mempengaruhi perbandingan antara senyawa penolik larut dan tak larut (Massaretto *et al.*, 2011). Pada penelitian ini kadar total penolik nasi yang sudah dikeringkan rata-rata sebesar 99,4 ppm.

Untuk menguji apakah tingkat hidrolisis pati dan aktivitas antioksidan nasi tergantung pada kadar total penol maka dilakukan analisis korelasi Pearson (Tabel 1). Seperti disebutkan dibagian awal pembahasan bahwa senyawa penolik memiliki aktivitas penghambatan terhadap enzim alpha amilase (Kalita *et al.*, 2018; Marmouzi *et al.*, 2017; Gondi dan Prasada, 2015) dan juga menentukan aktivitas antioksidan beras/nasi (Ye *et al.*, 2016; Jun *et al.*, 2015; Shao *et al.*, 2014). Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung

berhubungan dengan derajat hidrolisis pati ($p = 0,296$) dan aktivitas antioksidan ($p = 0,497$). Kadar total penol yang tidak berbeda nyata antara perlakuan diduga menjadi penyebab mengapa hubungan antara kadar total penol dengan derajat hidrolisis pati atau antioksidan tidak teramati.

Penerimaan Konsumen

Penggunaan rempah-rempah pada pemasakan

campuran rempah yang menghasilkan nasi dengan peringkat satu tetapi diketahui bahwa penggunaan campuran 2 g kunyit dan 1 g kayu manis (C2) atau 100 % kunyit (C1) memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan nasi yang dimasak dengan campuran yang lainnya (Figur 4).

Data penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan campuran rempah dan komposisinya tidak berpengaruh terhadap daya cerna pati dan aktivitas

Tabel 1. Hubungan antara kadar total penol dengan daya cerna pati dan aktivitas antioksidan nasi

Parameter pengamatan	Tingkat hidrolisis pati	Antioksidan
Antioksidan	Pearson correlation	-0,289
	P-Value	0,296
Total penol	Pearson correlation	-0,119
	P-Value	0,672

Tabel 2. Pengaruh komposisi rempah yang digunakan dalam pemasakan nasi terhadap respon hedonik nasi.

Parameter organoleptik	Komposisi rempah dalam campuran			
	C4	C3	C2	C1
Rasa	3,42 ^b	3,50 ^b	3,81 ^a	3,74 ^a
Aroma	3,33 ^b	3,48 ^{ab}	3,68 ^a	3,65 ^a
Kepulenan	3,60 ^b	3,68 ^{ab}	3,81 ^a	3,81 ^a
Warna	3,43 ^b	3,37 ^b	3,86 ^a	3,81 ^a

Keterangan: C1 = 3 gram kunyit, 0 gram kayu manis; C2 = 2 gram kunyit, 1 gram kayu manis; C3 = 1 gram kunyit, 2 gram kayu manis; C4 = 0 gram kunyit, 3 gram kayu manis; C5 = control. Respon konsumen : 1 = sangat tidak layak; 2 = tidak layak; 3 = kurang layak; 4 = layak; 5 = sangat layak

berbagai penelitian tersebut. Kadar total penol tidak nasi diduga dapat mengubah karakteristik sensori dari nasi yang dihasilkan. Karena campuran rempah dan herbal yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian gaya hidup khususnya pola makan, maka perubahan yang dihasilkan diharapkan tidak menurunkan tingkat penerimaan nasi yang dihasilkan sebagai makanan pokok. Masyarakat sudah terbiasa dengan nasi putih yang pemasakannya tidak menggunakan campuran rempah atau herbal, sehingga pada penelitian ini, nasi yang dihasilkan dari pemasakan menggunakan campuran rempah-rempah di uji kelayakannya sebagai makanan pokok yang akan menggantikan nasi putih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rempah-rempah dalam pemasakan nasi menghasilkan persepsi panelis yang berbeda-beda tergantung campuran yang digunakan (Tabel 2). Nasi yang dimasak menggunakan campuran 100% kayu manis (C4) memiliki tingkat kelayakan rasa, aroma, kepulenan dan warna yang lebih rendah dibandingkan nasi yang dimasak dengan campuran 2 g kunyit dan 1 g kayu manis (C2) atau 100 kunyit (C1). Penggunaan campuran 2 g kunyit dan 1 g kayu manis (C2) cenderung menghasilkan tingkat kelayakan tertinggi dibandingkan campuran yang lain dan nasi ini dapat dikategorikan layak sebagai makanan pokok.

Selain diminta menilai kelayakan nasi yang dihasilkan dengan pemasakan menggunakan campuran rempah-rempah, panelis juga diminta mengurutkan tingkat kelayakan nasi sebagai makanan pokok yang dimasak dengan campuran rempah-rempah dengan komposisi yang berbeda. Peringkat terbaik memiliki nilai 1 dan dianggap paling layak sebagai makanan pokok, dan peringkat terburuk adalah 4 dan dianggap paling jenis

tidak layak sebagai makanan pokok. Walaupun tidak ada antioksidan nasi yang dihasilkan. Data juga menunjukkan bahwa komposisi campuran rempah menghasilkan tingkat kelayakan sebagai makanan pokok yang berbeda menurut konsumen. Penggunaan 2 g kunyit dan 1 g kayu manis (C2) atau 100% kunyit (C1) lebih layak jika dibandingkan dengan penggunaan 100% kayu manis (C4) atau campuran 1 g kunyit dan 2 g kayu manis (C3). Karena itu C2 dan C1 merupakan formula yang bisa dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Penggunaan campuran rempah-rempah diduga akan memberi manfaat lebih dibandingkan jika menggunakan rempah-rempah tunggal. Karena itu untuk penelitian selanjutnya formula C2 dipilih untuk diuji respon glikemiknya.

Respon Glikemik Nasi


Pengukuran respon glikemik dilakukan terhadap nasi biasa (kontrol) dan nasi yang dimasak dengan penambahan formula C2. Formula C2 adalah perlakuan terbaik berdasarkan analisis penerimaan konsumen dan mengandung campuran kunyit dan kayu manis. Perubahan kadar gula rata-rata responden setelah mengonsumsi nasi biasa dan nasi yang dimasak dengan penambahan formula C2 dapat dilihat pada Figur 5.

Kadar glukosa rata-rata responden setelah 30 menit mengonsumsi nasi biasa (kontrol) sebesar 105,3 mg/dl dan untuk nasi dengan penambahan formula C2 sebesar 116,2 mg/dl. Figur 5 juga menunjukkan bahwa penyerapan gula maksimal dalam darah terjadi pada 30 menit pertama setelah mengonsumsi pangan uji.


Luas area di bawah kurva (LADK) kadar darah responden setelah mengonsumsi nasi dapat dilihat pada Figur 6. Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat

perbedaan yang signifikan ($p = 0,326$) antara LADK kedua nasi yang diuji (10947 unit untuk nasi biasa dan 11268 unit untuk dengan penambahan formula C2) dan hasil ini sejalan dengan hasil uji tingkat hidrolisis yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat hidrolisis pati nasi biasa dengan nasi yang dimasak dengan formula C2 (Figur 1).


Figur 7 memberikan penjelasan mengapa perbedaan LADK kedua jenis nasi yang diuji tidak berbeda nyata yaitu bahwa ragam data sangat tinggi sehingga walaupun nasi yang dimasak dengan formula C2 memiliki LADK lebih tinggi (11268 unit) dibandingkan nasi biasa (10947 unit), namun perbedaan ini tidak signifikan. Masing-masing nasi memiliki LADK yang bervariasi tergantung pada respondennya.



Figur 7. Luas area dibawah kurva nasi biasa (kontrol) atau nasi yang dimasak dengan penambahan formula C2 (C2) masing-masing responden



Figur 5. Respon glikemik rata-rata per waktu (0,30,60,90,120 menit) setelah mengonsumsi nasi biasa (kontrol) dan perlakuan C2. Nilai tengah yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari 10 responden



Figur 6. Luas area di bawah kurva gula darah setelah mengonsumsi nasi biasa (Kontrol) atau nasi yang dimasak dengan penambahan formula C2

Peningkatan kadar gula darah sebagai respon terhadap konsumsi suatu jenis pangan bersifat individual (Vrolix dan Mensink, 2010). Suatu jenis makanan yang sama dan dalam jumlah yang sama jika dikonsumsi oleh subjek yang berbeda akan menghasilkan kenaikan kadar gula darah yang berbeda. Hirsch *et al.* (2013) melaporkan bahwa konsumsi roti putih oleh 10 subjek yang sehat menghasilkan nilai LADK beragam dengan variasi rata-rata 51,8%. Keragaman ini antara lain dipengaruhi beberapa faktor yang tidak menjadi kriteria seleksi responden seperti indeks insulin dan kadar hemoglobin terglikasi (Matthan *et al.*, 2016).

Kesimpulan

Formulasi campuran kunyit dan kayu manis tidak dapat menurunkan daya cerna pati nasi *in vitro* atau meningkatkan aktivitas antioksidan nasi yang dihasilkan karena penggunaan campuran rempah tersebut tidak dapat meningkatkan total fenol nasi yang dihasilkan. Nasi yang dimasak menggunakan campuran 2 g kunyit dan 1 g kayu manis dianggap layak oleh panelis sebagai makanan pokok tetapi nasi ini memiliki respon glikemik yang tidak berbeda dengan nasi biasa.

Ucapan Terima kasih

Penelitian ini didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Program Penelitian Terapan tahun 2017-2018.

Daftar Pustaka

Anderson, J.W. 2006. Diabetes mellitus: medical nutrition therapy. In *Modern Nutrition in Health and Disease Tenth Edition*. Shils ME (Ed.). Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. Page 1043-1066.

EI, S.N. 1999. Determination of glicemic index for some breads. *Journal of Food Chemistry* 67(1):67-69. DOI: 10.1016/S0308-8146(98)00262-3

Dyson P. Low carbohydrate diets and type 2 diabetes: What is the latest evidence? *Diabetes Therapy* 6(4):411-424. DOI: 10.1007/s13300-015-0136-9

Ghosh, S., Chowdhury, S., Sarkar, P., Sil, P.C. 2018. Ameliorative role of ferulic acid

- against diabetes associated oxidative stress induced spleen damage. *Food Chemistry Toxicology* 118:272286. DOI: 10.1016/j.fct.2018.05.029.
- Gondi, M., Prasada Rao, U.J. 2015. Ethanol extract of mango (*Mangifera indica* L.) peel inhibits α amylase and α -glucosidase activities, and ameliorates diabetes related biochemical parameters in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. *Journal Food Science Technology* 52(12):7883-93. DOI: 10.1007/s13197-015-1963-4.
- Goufo, P., Trindade, H. 2014. Rice antioxidants: phenolic acids, flavonoids, anthocyanins, proanthocyanidins, tocopherols, tocotrienols, yoryzanol, and phytic acid. *Food Science Nutrition* 2(2):75-104. DOI: 10.1002/fsn3.86.
- Hirsch, S, Barrera, G., Leiva, L., de la Maza, M.P., Bunout, D. 2013. Variability of glycemic and insulin response to a standard meal, within and between healthy subjects. *Nutr Hosp.* 28(2):5414. DOI: 10.3305/nh.2013.28.2.6161.
- Hu, E.A., Pan, A., Malik, V., Sun, Q. 2012. White rice consumption and risk of type 2 diabetes: Metaanalysis and systematic review. *British Medical Journal* 15 : 344-1454. DOI:10.1136/bmj.e1454.
- Ismail, J., Runtuwene, M.R.J., Fatimah, F. 2012. Penentuan total fenolik dan uji aktivitas antioksidan pada biji dan kulit buah pinang Yaki (*Areca vestiaria* Giseke). *Jurnal Ilmiah Sains* 12(2):84-88. DOI: 10.1234/jis.v12i2.557
- Jun, H.I., Shin, J.W., Song, G.S., Kim, Y.S. 2015. Isolation and identification of phenolic antioxidants in black rice bran. *Journal Food Science* 80(2):C262-8. DOI: 10.1111/1750-3841.12754.
- Kalita, D., Holm, D.G., LaBarbera, D.V., Petrash, J.M., Jayanty, S.S. 2018. Inhibition of α -glucosidase, α amylase, and aldose reductase by potato polyphenolic compounds. *PLoS One* 25;13(1):e0191025. DOI 10.1371/journal.pone.0191025.
- Marmouzi, I., Karym, E.M., Saidi, N., Meddah, B., Kharbach, M., Masrar, A., Bouabdellah, M., Chabraoui, L., El Allali, K., Cherrah, Y., Faouzi, M.E.A. 2017. In vitro and in vivo antioxidant and anti-hyperglycemic activities of Moroccan Oat Cultivars. *Antioxidants (Basel)* 6;6(4). DOI: 10.3390/antiox6040102.
- Massaretto, I.L., Alves, M.F.M., de Mira, N.V.M., Carmona, A.K., Marquez, U.M.L. 2011. Phenolic compounds in raw and cooked rice (*Oryza sativa* L.) and their inhibitory effect on the activity of angiotensin I-converting enzyme. *Journal of Cereal Science* 54(2):236-240. DOI:10.1016/j.jcs.2011.06.006.
- Matthan, N.R, Ausman, L.M., Meng, H., Tighiouart, H., Lichtenstein, A.H. 2016. Estimating the reliability of glycemic index values and potential sources of methodological and biological variability. *American Journal Clinical Nutrition*104(4):10041013. DOI:10.3945/ajcn.116.137208.
- Muchtadi, T.R. 1989. *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. PAU Pangan dan Gizi, IPB. Bogor.
- Perez-Gregorio, M.R., Simal-Gandara, J. 2017. A Critical review of the characterization of polyphenolprotein interactions and their potential use for improving food quality. *Current Pharmaceutical Design* 23(19):2742-2753. DOI: 10.2174/1381612823666170202112530.
- Polce, S.A., Burke, C., França, L.M., Kramer, B., de Andrade Paes, A.M., Carrillo-Sepulveda, M.A. 2018. Ellagic acid alleviates hepatic oxidative stress and insulin resistance in diabetic female rats. *Nutrients*10(5):531. DOI: 10.3390/nu10050531.
- Resurreccion, A. V. A. 1998. *Consumer Sensory Testing For Product Development*. An Aspen Publication Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland
- Riccardi, G., Capaldo, B., Vaccaro, O. 2005. Functional foods in the management of obesity and type 2 diabetes. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care* 8(6):630-5. DOI:10.1097/01.mco.0000171126.98783.0c.
- Shao, Y., Xu, F., Sun, X., Bao, J., Beta, T. 2014. Phenolic acids, anthocyanins, and antioxidant capacity in rice (*Oryza sativa* L.) grains at four stages of development after flowering. *Food Chemistry* 143:90-6. DOI: 10.1016/j.foodchem.2013.07.042.
- Talaei B, Amouzegar A, Sahranavard S, Hedayati M, Mirmiran P, Azizi F. 2017. Effects of cinnamon consumption on glycemic indicators, advanced glycation end products, and antioxidant status in type 2 diabetic patients. *Nutrients* 9(9):E991. DOI: 10.3390/nu9090991
- Tian, S., Nakamura, .K, Kayahara, H. 2004. Analysis of phenolic compounds in white rice, brown rice, and germinated brown rice. *Journal of Agriculture Food Chemistry* 52(15):4808-13. DOI:10.1021/jf049446f
- Vrolix, R., Mensink, R.P. 2010. Variability of the glycemic response to single food products in healthy subjects. *Contemporary Clinical Trials* 31(1):5-11. DOI: 10.1016/j.cct.2009.08.001.
- Walter, M., Marchesan, E. 2011. Phenolic compounds and antioxidant activity of rice. *Brazilian Archives of Biology and Technology* 54(2):371-377. DOI:10.1590/S1516-89132011000200020.
- Wojcik, M., Krawczyk, M., Wojcik, P., Cypryk, K., Wozniak, L.A. 2018. Molecular mechanisms underlying curcumin-mediated therapeutic effects in type 2 diabetes and cancer. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity* 2018:1-14. DOI: 10.1155/2018/9698258.
- Ye, L., Zhou, S., Liu, L., Waters, D.L.E., Zhong, K., Zhou, X., Ma, X., Liu, X. 2016. Phenolic compounds and antioxidant capacity of brown rice in China. *International Journal of Food Engineering* 12(6):537-546. DOI: 10.1515/ijfe-2015-0346.
- Zheng, J., Cheng, J., Zheng, S., Feng, Q., Xiao, X. 2018. Curcumin, a polyphenolic curcuminoid with its protective effects and molecular mechanisms in

diabetes and diabetic cardiomyopathy. *Frontier in Pharmacology* 9:472. DOI: 10.3389/fphar.2018.00472.

Zhu, F. 2015. Interactions between starch and phenolic compound. *Trends in Food Science & Technology* 43:129-143. DOI:10.1016/j.tifs.2015.02.003.