

# Jurnal J-BEKH Rahmat Hidayat 2013

*By Hendri Busman*

---

WORD COUNT

2394

TIME SUBMITTED

19-JUN-2019 09:09AM

PAPER ID

47998828


**KUMPULAN ABSTRAK**

**Jurnal Ilmiah**

**BIOLOGI EKSPERIMENT dan**

**KEANEKARAGAMAN HAYATI**

---



Kerja Sama

**Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung**

**dan Perhimpunan Biologi Indonesia Cabang Lampung**

Vol. 1

No. 2

Juli 2013

ISSN : 2338-4344

# **KUMPULAN ABSTRAK**

## **Jurnal Ilmiah**

## **BIOLOGI EKSPERIMENT DAN**

## **KEANEKARAGAMAN HAYATI**

---

### **SUSUNAN PENYUNTING**

#### **Penanggung Jawab :**

Prof. Suharso, Ph.D.  
(Dekan FMIPA Universitas Lampung)

#### **Pengarah:**

Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc.  
(Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung)

#### **Ketua Redaksi :**

Drs. Suratman Umar, M.Sc.  
(Universitas Lampung)

#### **Sekretaris :**

Endang L. Widiastuti, Ph.D.  
(Universitas Lampung)

#### **Bendahara :**

Dra. C. N. Ekowati, M.Si.  
(Universitas Lampung)

#### **Tim Editor :**

Prof. Dr. Ida Farida Rivai (UNILA)  
Endang L. Widiastuti, Ph.D. (UNILA)  
Rochmah Agustrina, Ph.D. (UNILA)  
Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc. (UNILA)  
Dr. Herawati Soekardi., M.S. (UNILA)  
Dr. Dwi Hapsoro, M.Sc. (UNILA)

#### **Administrasi :**

Ambar Widiastuti N.  
Ali Suhendra, S.Si.

**5 Sekretariat :**

Gd. Laboratorium Biologi I Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung  
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telp./Fax (0721) 704625 Ext. 705 E-mail : jubex.kh@gmail.com

HISTOPATOLOGI GINJAL MENCIT (*Mus musculus L.*) JANTAN  
AKIBAT RADIASI CAHAYA LAMPU MERKURI

HISTOPATHOLOGY OF RENAL MALE MICE (*Mus musculus L.*)  
AFFECTED BY RADIATION LIGHTNING OF MERCURY LAMP

Rahmat Hidayat<sup>1</sup>, Hendri Busman<sup>1</sup>, Nuning Nurcahyani<sup>1</sup>

23

<sup>1</sup> Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung, Bandar Lampung  
e-mail : rabel89@rocketmail.com

5

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung  
Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35145

ABSTRAK

Lampu merkuri menjadi salah satu pilihan karena memiliki umur nyala yang panjang, hingga 24.000 jam. Radiasi yang dipancarkan lampu ini bukan hanya dalam bentuk fisik tampak, tetapi juga berupa gelombang elektromagnetik dan akan berinteraksi dengan semua materi yang memiliki potensial listrik. Untuk melihat pengaruh radiasi cahaya lampu merkuri terhadap struktur tubulus ginjal mencit (*Mus musculus L.*) jantan maka telah dilaksanakan penelitian di laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. Pembuatan preparat histologi ginjal dilaksanakan di Laboratorium <sup>22</sup>Zoologi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November 2012. Kerusakan tubulus ginjal yang ditemukan dalam pemajangan 12 dan 16 jam/hari selama 21 hari berupa perdarahan intertubular, piknosis, kariorekisis, kariolisis, kongesti, dan nekrosis. Perdarahan intertubulus hanya ditemukan pada perlakuan 4 jam/hari, sedangkan pada perlakuan 8 jam/hari ditemukan perdarahan intertubulus, piknosis, dan kariorekisis.

Kata kunci : Radiasi, lampu merkuri, tubulus ginjal, mencit (*Mus musculus L.*).

Abstract

Mercury lamp is widely used since it has long-lifes, up to 24,000 hours. Radiation generated by the lamp is not only in the form of physical, but <sup>18</sup>so results electromagnetic waves which will interact with all materials that has electrical potential. The purpose of the research was to observe <sup>17</sup> effects of merkuri lamp radiation on the structure of renal tubules of male mice (*Mus musculus L.*). The research was conducted in the laboratory of Zoology Department of University of Lampung, for rearing and treatment of test animals, while slides production of ren anatomy conducted in Pathology Laboratory Regional III Bandar Lampung from October to November 2012. Renal tubular damage such as intertubular haemorrhage, pyknosis, karyorrhexis, karyolysis, congestion, and necrosis were found in 12 and 16 hours/day of exposure for 21 days. Meanwhile treatment of 4 hours/day only caused intertubular haemorrhage, whereas treatment of 8 hours/day was caused intertubulus haemorrhage, pyknosis, and karyorrhexis.

Keyword : Radiation, renal tubulus, mice (*Mus musculus L.*)

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan fisiologi manusia antara lain: *microwave*, komputer, telepon, televisi, alat-alat kedokteran, mobil, lampu, dan benda-benda elektronik lain yang memancarkan radiasi gelombang elektro-magnetik maupun elektrostatik, beberapa bahkan dapat memodifikasi gen (Lim, 2008).

Lampu merkuri *blended* merupakan kombinasi lampu pijar dengan lampu merkuri fluoresen. Lampu pijar menghasilkan warna kekuningan sedangkan yang dihasilkan lampu merkuri fluoresen cahayanya dominan ultra violet. Filamen tungsten dihubungkan seri dengan salah satu elektroda utama yang berfungsi untuk membatas arus saat lampu bekerja dengan demikian lampu merkuri *blended* ini tidak memerlukan balas lagi di luar filamen tungsten. Di samping sebagai pembatas arus, juga berfungsi untuk menghasilkan cahaya dominan infra merah. Filamen ini akan menyerap sebagian panas yang dihasilkan lampu, sehingga berakibat mengurangi efisiensi lampu dan rentang usia pemakaian. Oleh karena itu efisiensinya antara 12 sampai 25 lumen/watt, sedangkan rentang usianya sampai dengan 6.000 jam menyala.

Penggunaan lampu ini merupakan alternatif pengganti lampu pijar untuk penerangan industri dan komersial dengan efisiensi dan rentang usia pemakaian yang lebih tinggi, sehingga biaya pemasangan awal lebih rendah (Siswono, 2008).

Mencit merupakan hewan mamalia yang mempunyai peranan penting bagi manusia untuk tujuan ilmiah karena memiliki daya adaptasi yang baik dan memiliki beberapa keunggulan antara lain penanganan dan pemeliharaan yang mudah, sehat dan bersih, kemampuan reproduksi tinggi dengan masa kebuntingan singkat, serta memiliki karakteristik produksi dan reproduksi yang mirip dengan mamalia lainnya (Malole dan Pramono, 1989).

3

Secara anatomis ginjal terbagi menjadi 2 bagian yaitu korteks dan medulla. Di dalam kor-teks terdapat berjuta-juta nefron. Sedangkan di dalam medulla banyak terdapat duktuli ginjal. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas, tubulus kontortus proksimalis, kor-pusulus renal, tubulus kontortus distalis, segmen tipis, dan tebal ansa Henle, serta tu-bulus kolagens. Darah yang membawa sisa-sisa hasil metabolisme tubuh difiltrasi di dalam glomerulus kemudian di tubuli ginjal, beberapa zat yang masih diperlukan tubuh mengalami reabsorpsi dan zat-zat hasil sisa metabolisme mengalami sekresi bersama air membentuk urine. Setiap hari tidak kurang dari 180 liter air di tubuh difiltrasi di glomerulus dan menghasilkan urin 1-2 liter. Urin yang terbentuk di dalam nefron disalurkan melalui piramida ke sistem pelvikalis ginjal untuk kemudian disalurkan ke dalam ureter (Purnomo, 2009).

## BAHAN dan METODE

21

Pemeliharaan dan perlakuan hewan uji, dilaksanakan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung sedangkan pembuatan preparat histopatologi ginjal dilaksanakan di Laboratorium Patologi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Bandar Lampung dari bulan Oktober sampai November 2012.

Obyek penelitian ini berupa dua puluh ekor mencit (*Mus musculus L*) jantan dewasa dengan berat rata-rata 30-35 gram berumur delapan minggu yang diperoleh dari Bagian Breeding BPPV Regional III Bandar Lampung.

Sebelum percobaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi mencit selama 7 hari. Baik kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ditempatkan dalam ruangan percobaan yang sama. Terhadap kelompok percobaan dilakukan pencahayaan dengan lampu merkuri yang diletakkan pada jarak 1,5 meter dari mencit.

Perlakuanannya adalah pemajaman dengan lampu merkuri berdaya 160 watt atau sama dengan 1950 lux yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu 0 jam/hari, 4 jam/hari, 8 jam/hari, 12 jam/hari, dan 16 jam/hari selama 21 hari.

Setelah masa perlakuan berakhir, mencit-mencit ini kemudian dikorbankan dengan cara dislokasi leher. Hewan yang telah dinekropsi diambil ginjalnya, kemudian diawetkan di dalam larutan formalin 10%. Setelah larutan berpene-trasi sempurna ke dalam organ, langkah selanjutnya adalah *grossing*

(memilih bagian dari organ yang akan dijadikan sediaan histopa-tologi) kurang lebih dengan pemotongan sete-bal 0,5 cm (Samkhan dan Sri, 2006).


Data berupa deskripsi gambaran histologis tubulus ginjal mencit jantan yang dipajan caha-ya lampu merkuri dengan waktu yang berbeda.

## HASIL dan PEMBAHASAN


Pengamatan histopatologi terhadap ginjal mencit jantan akibat pemajanan radiasi cahaya lampu merkuri dengan perlakuan 0 jam/hari (kontrol), 4 jam/hari, 8 jam/hari, 12 jam/hari dan 16 jam/hari selama 21 hari, menunjukkan ada-nya beberapa kerusakan struktur histopatologi tubulus ginjal kecuali pada kelompok kontrol yang dapat dikatakan normal. Struktur histopa-tologi kelompok kontrol tidak menunjukkan ada-nya kerusakan pada tubulus ginjal seperti ko-ngesti, pendarahan intertubular, piknosis, kario-reksis, kariolisis, dan nekrosis. Pada kelompok 1 yaitu mencit dengan lama pemajanan 4 jam/hari selama 21 hari ditemukan adanya pen-darahan intertubular yang ditandai dengan pendarahan berlebih di ruang antar tubulus. Pada pemajanan 8 jam/hari juga ditemukan penda-rahan intra tubular, tetapi disertai terjadinya pik-nosis (inti sel menyusut, batas tidak teratur, dan berwarna gelap), serta karioreksis yaitu inti hancur, membentuk fragmen kromatin yang menyebar. Pada kelompok 3 dengan pemajan-an 12 jam/hari dan kelompok 4 dengan lama pemajanan 16 jam/hari. Ditemukan pendarahan intra tubular, piknosis, kongesti, kariolisis, kario-reksis, dan nekrosis (Gambar 1 – 5)

80 / Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati


Rahmat Hidayat




Gambar 1. Struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang tidak terpajan lampu merkuri (perbesaran 400x dengan pewarnaan HE). Keterangan A. Tubulus proksimal, B. Tubulus distal




Gambar 2. Struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang terpajan lampu merkuri 4 jam/hari selama 21 hari (kanan perbesaran 100x, kiri perbesaran 400x, pewarnaan HE). Keterangan : A. Perdarahan intertubular.



Gambar 3. Struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang terpajan lampu merkuri 8 jam/hari selama 21 hari (perbesaran 400x, pewarnaan HE). Keterangan : A. perdarahan intertubular, B. piknosis, dan C. kariorekxis.



Gambar 4. Struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang terpajan lampu merkuri 12 jam/hari selama 21 hari (perbesaran 400x, pewarnaan HE). Keterangan : A. piknosis, B. kariorekxis, C. kariolisis, D. kongesti, E. nekrosis dan F. perdarahan intertubular.



Gambar 5. Struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang terpajan lampu merkuri 16 jam/hari selama 21 hari (perbesaran 400x, pewarnaan HE). Keterangan : A. piknosis, B. kariorekxis, C. kariolisis, D. kongesti, E. nekrosis dan F. perdarahan intertubular.

Radiasi yang dihasilkan oleh cahaya lampu diduga tidak hanya dalam bentuk fisis tampak, tetapi berupa gelombang elektromagnetik yang akan berinteraksi dengan semua materi, khu-susnya yang bersifat listrik. Pemajaman radiasi cahaya lampu merkuri diduga berinteraksi dengan sel-sel tubuh mencit yang mengandung potensial listrik. Misalnya dalam bidang batas membran sel saraf atau otot terdapat ion-ion yang terdiri dari muatan positif seperti  $K^+$  dan  $Na^+$  pada permukaan luar dan ion-ion bermuatan negatif seperti ion  $Cl^-$  di dalam bidang batas/membran (Cameron, 2006). Induksi yang ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik (EM) yang melebihi batas ambang dapat menyebabkan tersimpannya sejumlah elektron di dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan tubuh mengalami kelebihan elektron, sehingga akan mengganggu sistem saraf dan mengakibatkan koordinasi antar sel terganggu, pada akhirnya kerja organ tubuh akan terganggu (Baffai, 2003).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanjangan yang berbeda pada masing-masing kelompok terhadap gelombang elektromagnetik lampu merkuri menunjukkan variasi kerusakan berbanding lurus dengan lama pemajangan artinya semakin lama pemajangan semakin banyak kerusakan yang ditemukan. Dari data hasil penelitian pada mencit jantan kelompok 1 (0 jam/hari) yang merupakan kontrol, gambaran histopatologi ginjal tidak menunjukkan adanya kerusakan (Gambar 7). Ditemukan kerusakan berupa perdarahan intertubular pada perlakuan 4, 8, 12, dan 16 jam/hari. Ciri-ciri perdarahan intertubular dapat dilihat pada gambaran histo-patologi ginjal dengan ditemukannya darah dalam jumlah banyak di ruang antar tubulus (Gambar 8). Pikknosis dan kariooksisis ditemukan pada perlakuan 8, 12 dan 16 jam/hari. Selanjutnya kariolisis, kongesti dan nekrosis ditemukan pada perlakuan 12 dan 16 jam/hari (Gambar 10).

2

Ada dua teori tentang kerusakan sel, baik sel kanker maupun sel normal akibat radiasi elektromagnetik. Yang pertama yaitu teori target, dimana elektron langsung merusak DNA (reaksi langsung) bila radiasi elektromagnetik ini mengenai ginjal hal ini diduga akan menyebabkan sel kariolisis, kariooksisis dan pikknosis. Dan yang kedua teori racun air (reaksi tidak langsung), dimana elektron menimbulkan terbentuknya ion radikal yang dapat merusak DNA dan struktur sel lainnya (Yunarti, 2007).

2

Radiasi elektromagnetik yang mengenai sel di-duga menyebabkan atom hidrogen ( $H^+$ ) pada molekul air mengalami pembelahan heterolitik (ionisasi) sehingga terbentuk ion hidrogen ( $H^+$ ) dan ion hidroksil ( $OH^-$ ) yang sangat reaktif. Radikal hidrogen ( $H^+$ ) dan hidroksil ( $OH^-$ ) akan menyebabkan berbagai macam efek pada molekul lain pada sistem biologik sehingga mengganggu integritas sel (Boag, 1975).

Gelombang elektromagnetik juga diduga menyebabkan disintasi terhadap mencit sehingga menyebabkan sepsis dan syok dimana kejadian ini membuat hipoperfusi ginjal akibat vasodilatasi sistemik dan vasokonstriksi pembuluh darah di ginjal. Hal tersebut akan meng-induksi serangkaian lintasan metabolisme yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di ginjal dapat berupa perdarahan intertubular atau kongesti ginjal (Robbins dan Kumar, 1992).

Dalam penelitian ini nekrosis dapat ditemukan pada perlakuan 12 dan 16 jam/hari (Gambar 10 dan 11). Jelas seperti perdarahan yang berupa kongesti dan perdarahan intertubular yang disebabkan pemajangan gelombang elektromagnetik lampu merkuri diduga menyebabkan ion-ion seperti natrium dan hidroksil di dalam lumen tubulus meningkat. Tingkatan  $Na^+$  dan  $OH^-$  ini menyebabkan derajat keasaman sel di tubulus meningkat sehingga epitel tubulus terlepas dan mikrovilli akan membentuk silinder sehingga terjadi obstruksi tubulus dan akhirnya terjadi nekrosis (Sudoyo et al., 2006).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap struktur histopatologi ginjal mencit jantan yang terpajang lampu merkuri dapat disimpulkan bahwa tubulus ginjal mencit yang terpajang mengalami kerusakan berupa perdarahan intertubular, pikknosis, kariooksisis, kariolisis, kongesti, dan nekrosis.

7

## DAFTAR PUSTAKA

Arrington, L. R. 1972. *Introductory Laboratory Animal. The Breeding, Care and Management of Experimental Animal Science*. The Interstate Printers and Publishing, Inc., New York.

16

Baffai, U. 2003. Pengaruh Pempararan Medan Listrik Terhadap Perilaku Mencit. Buletin Utama UISU, V 01.

7.

2

Boag. 1975. *The time scale of effect in radiation biology*. In : Steel GG. *Basic clinical radiobiology*. 2nd edition. Oxford university : London

14 meron, R. J. 2006. *Fisika Kedokteran: Fisika Tubuh Manusia*. Sagung Seto. Jakarta.

4 m, F. 2008. *Filsafat teknologi tentang dunia, manusia dan alat*. Kanisius : Yogyakarta.

Malole, M. B. M. dan C. SPramono. 1989. *Penggunaan Hewan-hewan Percobaan Laboratorium*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Institut Pertanian Bogor : Bogor.

Purnomo, B. 2009. *Dasar-dasar Urologi*. Sagung Seto: Jakarta.

20

Robbins, S. L dan Kumar. 1992. *Buku Ajar Patologi I*. Universitas Airlangga: Jakarta.

11

Rinawati, W. dan Aulia, D. 2011. *Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) sebagai Penanda Baru Nekrosis Tubular Akut*. Departemen Patologi Klinik, RSUPN Cipto Mangunkusumo/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.

9

Sanchez, O., A. Arnau, M. Pareja., E. Poch., I. Ramirez., J. Araya. 2002. *Changes in (Na<sub>+</sub> K<sub>+</sub>)-Adenosine Triphosphatase Activity and Ultrastructure of Lung and Kidney Associated With Oxidative Stress induced by Acute Ethanol intoxication*. American College of Chest Physicians, 82 / Biologi Eksperimen dan Keanekaragaman Hayati Rahmat Hidayat

8

Samkhan dan S. Nati. 2006. *Tata Cara Penanganan Dan Pengirimam Contoh ke Laboratorium*. Buletin Laboratorium Veteriner.. Vol : 6 No:3  
<http://192.08ub.files.wordpress.com/2012/01/pedoman-kode-etik-hewan-coba.doc>

10 wono, 2008. *Teknik listrik industri jilid 1 untuk smk*. DEPDIKBUD Dikmenjur : Jakarta.

Sudoyo A.W, Setiyohadi B, Alwi I, K MS, Setiati S. 2006. *Buku Ajar Ilmu Perawatan*. Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI

Valberg, V. A., R. Kavet, and C. N. Rafferty. 1997. *Can Low Level 50/60 Hz Electric Field Cause Biological Effects Radiat* Research 148, pp2 - 21, 1997.

<http://www.scribd.com/doc/37531663/Can-Low-Level-50-60-Hz-Electric-and-Magnetic-Fields-Cause-Biological-Effects>. Diakses 10 juni 2012

Wararindi. 2011. *Membuat Preparat Organ*. <http://wararindi.wordpress.com/2011/06/07/membuat-preparat-organ/>. Diakses; Sabtu, 2 Juni 2012.

Yunarti. 2007. *Pengaruh Pholiphenols Teh Hijau Terhadap Kapasitas Produksi TNF-α Oleh Sel Mononuklear Darah Tepi Pada Penderita Karsinoma Nasofaring Yang Mendapat Radioterapi*. Universitas Diponegoro ; Semarang. Avialable in <http://eprints.undip.ac.id/17711/1/Yunarti.pdf> diakses 30 maret 2013

# Jurnal J-BEKH Rahmat Hidayat 2013

---

## ORIGINALITY REPORT

---

# 23%

## SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1  | <a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a><br>Internet   | 108 words — 4% |
| 2  | <a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a><br>Internet   | 101 words — 4% |
| 3  | <a href="http://referatnaya.blogspot.com">referatnaya.blogspot.com</a><br>Internet   | 40 words — 2%  |
| 4  | <a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a><br>Internet   | 29 words — 1%  |
| 5  | <a href="http://journal.bio.unsoed.ac.id">journal.bio.unsoed.ac.id</a><br>Internet   | 27 words — 1%  |
| 6  | <a href="http://juke.kedokteran.unila.ac.id">juke.kedokteran.unila.ac.id</a><br>Internet   | 25 words — 1%  |
| 7  | <a href="http://repository.ipb.ac.id">repository.ipb.ac.id</a><br>Internet   | 25 words — 1%  |
| 8  | <a href="http://ebookinga.com">ebookinga.com</a><br>Internet   | 24 words — 1%  |
| 9  | <a href="#">Saradha, B.. "Lindane induces testicular apoptosis in adult Wistar rats through the involvement of Fas-FasL and mitochondria-dependent pathways", Toxicology, 20090131</a><br>Crossref | 24 words — 1%  |
| 10 | <a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a><br>Internet   | 23 words — 1%  |

- 11 eprints.umm.ac.id  
Internet 23 words — 1%
- 12 indonesia.digitaljournals.org  
Internet 19 words — 1%
- 13 tethys.pnnl.gov  
Internet 13 words — 1%
- 14 Demmallino, Eymal B., M. Saleh S. Ali, Abd. Qadir Gassing, Munsi Lampe, La Nalefo, Nurbaya Busthanul, and Tamzil Ibrahim. "Policy and Backwardness of Maritime Society Case Study on Community Maritime Affairs Bugis Makassar South Sulawesi", Journal of Sustainable Development, 2016.  
Crossref 11 words — < 1%
- 15 Evans, . "Preanalytical Variables", Animal Clinical Chemistry A Practical Handbook for Toxicologists and Biomedical Researchers Second Edition, 2009.  
Crossref 10 words — < 1%
- 16 ayaputra47.blogspot.com  
Internet 10 words — < 1%
- 17 id.scribd.com  
Internet 10 words — < 1%
- 18 seminar.fpp.undip.ac.id  
Internet 10 words — < 1%
- 19 eprints.uny.ac.id  
Internet 9 words — < 1%
- 20 repository.unair.ac.id  
Internet 9 words — < 1%
- 21 media.neliti.com  
Internet 8 words — < 1%
- 22 docplayer.info  
Internet 8 words — < 1%

23

Gina Dania Pratami, Rika Raffiudin, I Made Samudra. "KARAKTERISASI MORFOLOGI TIGA GENUS SERANGGA PENGGEREK (LEPIDOPTERA: PYRALOIDEA)", JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA, 2016

6 words — < 1%

Crossref

EXCLUDE QUOTES OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF