

ISSN 1410 - 4020
EISSN 2047 - 1781

Jurnal Penelitian
Pertanian Terapan

Volume 18 No 2, 2018

Penanggung Jawab (Advisor) Kepala Unit Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri
Lampung

Sidang Penyunting (Editors)
Analianasari

Penyunting Pelaksana (Editors Technic)
Epro Barades
Desi Maulida

Sidang Penelaah (Editorial Board)

Jaenudin Kartahadimaja (Polinela)
Beni Hidayat(Polinela)
Sarono (Polinela)
Nurbani Kalsum(Polinela)
Lisa Erfa (Polinela)
Irmayani Noer (Polinela)
Meinilwita Yulia (Polinela)
Fitriani (Polinela)

Ainin Niswati (Unila)
Dwi Hapsoro (Unila)
Sumaryo Gs (Unila)
Nanik Sriyani (Unila)
Sri Yusnaini (Unila)
Yusnita Yusnita (Unila)
Diding Suhandy (Unila)
Edi Santosa (IPB)
Purwiyanto Haryadi (IPB)

Kesekretariatan

Suharja
Septa Manhalul Latif
Husna

Jurnal Penelitian Pertanian Terapan (ISSN 1410 – 5020; e-ISSN 2047-178) diterbitkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik Negeri Lampung, sebagai wahana informasi ilmiah hasil-hasil penelitian bidang pertanian secara umum yang bersifat terapan terbit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Biaya Penulisan Naskah dan Peminat Jurnal

Redaksi menerima naskah dari staf pengajar, mahasiswa, maupun praktisi dengan ketentuan penulisan seperti tercantum pada halaman belakang. Naskah yang disetujui untuk dimuat akan dikenakan kontribusi biaya Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per lima halaman pertama, selebihnya ditambah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per halaman. Biaya cetak untuk objek dan halaman berwarna sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Biaya kontribusi harus diselesaikan sebelum penerbitan dengan dua cara, yaitu:

1. Diantar langsung ke alamat redaksi; 2. Melalui rekening Bank BRI Cabang Natar Nomor Rekening 0660-01-018908-50-3 atas nama Analianasari.. Salinan bukti pembayaran mohon dikirim ke redaksi. Setiap penulis akan mendapatkan 1 (satu) eksemplar jurnal Bagi peminat yang ingin mendapatkan jurnal dikenakan penggantian biaya cetak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap eksemplar (belum termasuk ongkos kirim). Dan bagi peminat yang ingin berlangganan (Lembaga/Institusi atau perorangan) dapat kami layani dengan biaya langganan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun (termasuk ongkos kirim).

ALAMAT REDAKSI

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lampung
Jl. Soekarno-Hatta No. 10, Rajabasa, Bandar Lampung Tel. (0721)703995 Fax. (0721)787309
E-mail : jppt@polinela.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa tercurah ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karuni-Nya sehingga jurnal Penelitian Pertanian Terapan (JPPT) dapat terbit sesuai jadwal. Pada Tahun 2019 ini Jurnal Penelitian Pertanian Terapan (JPPT) telah mencapai terbitan volume ke -19. Tahun ini redaksi masih melakukan berbagai perbaikan dalam kualitas cetakan dan optimalisasi laman internet.

Oleh karena itu, untuk optimalisasi dan meningkatkan sitasi maka Jurnal Penelitian Pertanian Terapan kami memperkenalkan kembali laman yang sebelumnya www.jpptonline.or.id telah berubah menjadi www.jurnal.polinela.ac.id/JPPT. Harapan kami dengan perubahan laman tersebut informasi riset yang terbit dalam Jurnal Penelitian Pertanian Terapan dapat diakses lebih luas dan meningkatkan indeks sitasi.

Pada volume ke 18 No 2 ini, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan memuat artikel tentang Identifikasi kandungan logam timbal (Pb) pada buah nangka (*artocarpus heterophyllus*) di media jalan kota bandar lampung, pengaruh komposisi kompos baglog terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (*Allium ascalonicum* L.), aplikasi kompos dan arang aktif sebagai bahan amelioran di tanah berpasir terhadap pertumbuhan tanaman caisim (*Brassica juncea* L.), analisis jalur respons hasil kedelai (*glycine max* (L.) Merr.) Varietas unggul nasional terhadap dua cara pemberian kombinasi pupuk npk, efikasi herbisida isopropilamina glifosat dalam mengendalikan gulma perkebunan karet (*Hevea brasiliensis*) belum menghasilkan, penggunaan metode soft independent modelling of class analogy dan uv-vis spectroscopy untuk membedakan kopi bubuk robusta asal jawa dan sumatera secara cepat, effect of kirinyuh leaf extract (*cromolaena odorata* [L.] R.M. king & H. Rob) on rice paddy growth (*Oryza sativa* L.) Variety of mekongga in drought stress condition, responses of kemiri sunan (*reutealis trisperma*) seeds germination to chemical scarification at various submersion time in sulfuric acid, response of growth and results of sweet corn plants (*zea mays saccharata* sturt.) To the effect of dosage and time of fertilizing bio-slurry liquid fertilizers, stability results of new rice pulses (*Oryza sativa* L.) F4 and F5.

Redaksi mohon maaf apabila dalam terbitan volume 18 No 1 Tahun 2018 masih banyak kekurangan dan kesalahan. Redaksi memohon masukan saran dari penulis dan pembaca demi kesempurnaan JPPT edisi ini, semoga media ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan jurnal Penelitian pertanian terapan terbitan-terbitan berikutnya.

Bandar Lampung, Mei 2018

Redaksi

Volume 18, Nomor 2, Tahun 2018

DAFTAR ISI

Identifikasi Kandungan Logam Timbal (Pb) Pada Buah Nangka (<i>Artocarpus Heterophyllus</i>) Di Media Jalan Kota Bandar Lampung	64-72
Rama Wicaksa, Agus Setiawan, Slamet Budi Yuwono, Samsul Bakri	
Pengaruh Komposisi Kompos Baglog Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (<i>Allium ascalonicum</i> L.)	137-145
Badri Burhan, Riski Proyogo	
Aplikasi Kompos dan Arang Aktif Sebagai Bahan Amelioran di Tanah Berpasir Terhadap Pertumbuhan Tanaman Caisim (<i>Brassica juncea</i> L.)	81-86
Priyadi Priyadi, Jamaludin Jamaludin, Windu Mangiring	
Analisis Jalur Respons Hasil Kedelai (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.) Varietas Unggul Nasional Terhadap Dua Cara Pemberian Kombinasi Pupuk NPK	87-100
Paul Benyamin Timotiwu, Yayuk Nurmiaty, Eko Pramono, Yosep Riando Kusuma	
Efikasi Herbisida Isopropilamina Glifosat Dalam Mengendalikan Gulma Perkebunan Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) Belum Menghasilkan	101-109
Hendi Pamungkas, Dad R.J. Sembodo, Rusdi Evizal, Hidayat Pujisiswanto	
Penggunaan Metode Soft Independent Modelling Of Class Analogy Dan Uv-Vis Spectroscopy Untuk Membedakan Kopi Bubuk Robusta Asal Jawa Dan Sumatera Secara Cepat	110-115
Diding Suhandy	
Effect of Kirinyuh Leaf Extract (<i>Cromolaena odorata</i> [L.] R.M. King & H. Rob) On Rice Paddy Growth (<i>Oryza sativa</i> L.) Variety of Mekongga in Drought Stress Condition	116-122
Sarti Wahyuni, Martha L. Lande, Zulkifli Zulkifli, Tundjung T. Handayani	
Responses of Kemiri Sunan (<i>Reutealis trisperma</i>) Seeds Germination To Chemical Scarification Atvarious Submersion Time In Sulfuric Acid (H₂SO₄)	123-127
Ahmad Deni Ismail, Duryat Duryat	
Response of Growth and Results of Sweet Corn Plants (<i>Zea mays Saccharata</i> Sturt.) To the Effect of Dosage and Time of Fertilizing Bio-slurry Liquid Fertilizers	128-136

Vina Oktavia, Hidayat Pujisiswanto, Akari Edy, Tri Dewi Andalarari

Stability Results Of New Rice Pulses (*Oryza sativa* L.) F4 and F5
Yogi Pratama Sy, Jaenudin Kartahadimaja, Eka Erlinda Syuriani

137-145

Jurnal Penelitian Pertanian Terapan

ISSN 1410-5020 e-ISSN 2047-178



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **IDENTIFIKASI KANDUNGAN LOGAM TIMBAL (PB) PADA BUAH NANGKA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) DI MEDIA JALAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penulis : Wicaksa Rama, Setiawan Agus, Yuwono Slamet Budi, Bakri Samsul

NIP : 196412231994031003

Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Publikasi : Jurnal Terakreditasi Nasional - *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol 18, No 2 (2018)

Sinta : S2

Penerbit : Penerbit Politeknik Negeri Lampung

URL/ web : <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/JPPT/article/view/684>

Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP. 19611020198603 1002

Bandar Lampung, 01 Maret 2021

Penulis

Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.
NIP 196412231994031003

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung



Dr. Lusmelilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	22/03/2021
NO INVEN	107/9/A/N/FP/2021
JENIS	Jurnal
PARAF	

Vol. 18 No. 2 (2018)

Published: 2019-05-15

Artikel

Identifikasi Kandungan Logam Timbal (Pb) Pada Buah Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*) Di Media Jalan Kota Bandar Lampung

Rama Wicaksa, Agus Setiawan, Slamet Budi Yuwono, Samsul Bakri
64-72

Pengaruh Komposisi Kompos Baglog Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.)

Badri Burhan, Riski Proyogo
73-80

Aplikasi Kompos dan Arang Aktif Sebagai Bahan Amelioran di Tanah Berpasir Terhadap Pertumbuhan Tanaman Caisim (*Brassica juncea* L.)

Priyadi Priyadi, Jamaludin Jamaludin, Windu Mangiring
81-86

Analisis Jalur Respons Hasil Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.) Varietas Unggul Nasional Terhadap Dua Cara Pemberian Kombinasi Pupuk NPK

Paul Benyamin Timotiwu, Yayuk Nurmiaty, Eko Pramono, Yosep Riando Kusuma
87-100

Efikasi Herbisida Isopropilamina Glifosat Dalam Mengendalikan Gulma Perkebunan Karet (*Hevea Brasiliensis*) Belum Menghasilkan

Hendi Pamungkas, Dad R.J. Sembodo, Rusdi Evizal, Hidayat Pujisiswanto
101-109

Penggunaan Metode Soft Independent Modelling Of Class Analogy Dan Uv-Vis Spectroscopy Untuk Membedakan Kopi Bubuk Robusta Asal Jawa Dan Sumatera Secara Cepat

Diding Suhandy
110-115

Effect of Kirinyuh Leaf Extract (*Cromolaena odorata* [L.] R.M. King & H. Rob) On Rice Paddy Growth (*Oryza sativa* L.) Variety of Mekongga in Drought Stress Condition

Sarti Wahyuni, Martha L. Lande, Zulkifli Zulkifli, Tundjung T. Handayani
116-122

Responses of Kemiri Sunan (*Reutealis trisperma*) Seeds Germination To Chemical Scarification Atvarious Submersion Time In Sulfuric Acid (H₂SO₄)

Ahmad Deni Ismail, Duryat Duryat

123-127

Response of Growth and Results of Sweet Corn Plants (*Zea mays Saccharata* Sturt.) To the Effect of Dosage and Time of Fertilizing Bio-slurry Liquid Fertilizers

Vina Oktavia, Hidayat Pujisiswanto, Akari Edy, Tri Dewi Andalsari

128-136

Stability Results Of New Rice Pulses (*Oryza sativa* L.) F4 and F5

Yogi Pratama Sy, Jaenudin Kartahadimaja, Eka Erlinda Syuriani

137-145

Identifikasi Kandungan Logam Timbal (Pb) Pada Buah Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*) Di Media Jalan Kota Bandar Lampung

Identification of Thermal Metal Content (Pb) on Restricted Art (*Artocarpus heterophyllus*) In The Media City Of Bandar Lampung

Rama Wicaksa*, Agus Setiawan, Slamet Budi Yuwono, dan Samsul Bakri

University of Lampung

*E-mail : ricaksaa@gmail.com

ABSTRACT

*Lead (Pb) is a heavy metal that naturally exists in the earth's crust and diffuses in small amounts through natural and artificial processes. This study aims to determine the amount of lead contained in the fruit jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) in the median street Bandar Lampung City. To know the factors that affect the lead content of jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) is done regression analysis. Research shows that the lead content of the jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) in the median of Bandar Lampung City road has exceeded the consumption limit, besides the factors affecting the lead content of the jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) to be the tree season, the geometry of the bend, the topography of the incline and the derivative.*

Keywords: Artocarpus heterophyllus, buah nangka, logam berat, timbal (Pb)

Disubmit : **17 Desember 2018** Diterima: **16 April 2018**, disetujui: **28 Mei 2018**

PENDAHULUAN

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kota yang terus berkembang dari tahun ketahun, dalam perkembangan yang terjadi diikuti pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, pertumbuhan dan jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 yaitu sejumlah 2.755.953 kendaraan, sehingga akan mengakibatkan suatu kemacetan pada jalan-jalan tertentu (BPSBL, 2014). Peningkatan jumlah kendaraan akan diiringi oleh peningkatan jumlah polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor pada Kota Bandar Lampung, sebab kecepatan kendaraan yang melajur dengan jumlah kendaraan yang banyak akan mengakumulasi kandungan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor salah satunya timbal (Pb) (Muziansyah, 2015).

Untuk mengurangi emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor maka dilakukan penanaman pada hutan Kota dan jalur hijau. Kota Bandar Lampung melakukan penanaman pohon dan tumbuhan pada jalur hijau atau median jalan, jenis tanaman yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung salah satunya ialah jenis tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Penanaman jenis tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus*) yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Dahlan, 2008) bahwa jenis tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus*) memiliki kemampuan daya serap emisi termasuk timbal.

Menurut (Widyasari et al., 2013) timbal merupakan logam berat yang terdapat secara alami pada bagian dalam kerak bumi dan tersebar kealam melalui proses alami. Timbal digunakan dalam campuran bensin untuk meningkatkan kinerja pembakaran, Indonesia merupakan salah satu negara tertinggal sebab beberapa negara sudah tidak menggunakan timbal sebagai campuran bensin (Witoelar R., 2005). Timbal merupakan

satu logam yang bersifat toksik, jika terakumulasi makhluk hidup maka berpotensi memicu keracunan bahkan untuk jangka panjang akan menyebabkan kematian (Widyasari et al., 2013 & Maksum, 2013).

Menjadi hal yang begitu menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai kandungan timbal yang berada pada buah nangka, sebab terlepasnya kandungan timbal (Pb) pada udara bebas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dikhawatirkan akan mempengaruhi kandungan suatu tanaman yang ada disekitar jalan, sering kita jumpai masyarakat menyukai untuk mengonsumsi buah nangka baik dalam keadaan matang buah atau matang dimasak hingga menjadi suatu produk olahan minuman dan lainnya, sehingga buah nangka (*Artocarpus heterophyllus*) yang terkandung timbal melebihi batas kandungan menjadi sangat berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat (Rukman, 1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 7 (tujuh) median jalan Kota Bandar Lampung yang ditanami nangka yaitu, Jl. Kapten Abdul Haq, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Jl. Teuku Umar, Jl. Sumantri Brojonegoro, Jl. Sultan Agung, Jl. Mayjen HM Ryacudu, Jl. Letjen Alamsyah Ratuparawinegara. Analisis sampel buah nangka dilakukan di laboratorium Kimia Universitas Lampung pada bulan Juli – Agustus 2017.

Objek dan Alat Penelitian. Objek penelitian adalah buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung yang di ambil dari 7 jalan lokasi penelitian. Sebanyak 30 sampel buah nangka diambil dan dianalisis. Alat yang digunakan perlengkapan alat tulis, kamera, komputer, gunting ranting, pitameter, haga altimeter, meteran, seperangkat instrumen Spektro Serapan Atom (SSA), dan *software* Minitab 16.

Cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama menentukan sampel pohon yang akan digunakan, selanjutnya lakukan pengukuran tinggi pohon menggunakan Christen meter, pengukuran diameter batang pohon dilakukan menggunakan pita meter, pengukuran kelembatan daun pohon menggunakan aplikasi *habitapp* sehingga langsung mendapatkan berapa persen dari kelembatan daun pohon tersebut, ketinggian buah pohon diukur dengan carapengukuran buah dari dari dasar permukaan tanah, usia pohon didapatkan berdasarkan keterangan masyarakat sekita, pengukuran kandungan udara lingkungan sekitar pohon diukur menggunakan RH Meter AMF062, keberadaan pohon lain dicatat sesuai lokasi, data kepadatan lalu lintas diambil dengan cara sensus kendaraan 1x24 jam tiap lokasi sampel, jarak pohon dari lampu merah didatkan dengan pengukuran menggunakan meteran, topografi jalan tikungan, perempatan, dan lurus, geometri jalan tanjakan, turunan dan dataran dicatat sesuai kondisi letak sampel, lebar jalan dilakukan pengukuran menggunakan meteran dan jumlah lajur jalan dihitung sesuai jumlah lajur jalan yang terdapat pada lokasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel buah dan dilakukan pemotongan buah dengan ukuran 5x5 cm untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis menggunakan metode analisis Spektro Serapan Atom (SSA).

Analisis Sampel . Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Lampung yang selanjutnya akan dilakukan Analisis Spektro Serapan Atom (SSA) untuk mendapatkan kandungan timbal (Pb) pada buah nangka.

Analisis Data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan persamaan regresi linear. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu (Law & Kelton, 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Jl. Kapten Abdul Haq. Kondisi tegakan pada median jalan ini tergolong padat dan rapat sebab jarak tanaman satu dan lainnya hanya 2,5 m. Bentuk tajuk yang ditemukan ialah berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisa 2-8 m, jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman kerai payung (*Filicium decipiens*), dan mahoni (*Swietenia Mahagoni*). Pada Jl. Kapten Abdul Haq geometri jalannya berbentuk perempatan pada sampel 1, tikungan pada

sampel 2, dan lurus pada sampel 3 dan 4. Untuk topografi jalan berbentuk dataran pada sampel 1-3 dan berbentuk tanjakan pada sampel 4.

Kondisi Jl. Zainal Abidin Pagar Alam. Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 2-3 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 1,5-6 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia Mahagoni*), palem (*Dryophloeus Beguinii*), Kurma (*Phoenix dactylifera*) dan tanaman hias pucuk merah (*Syzygium oleana*). Pada Jl. Zainal Abidin Pagar Alam geometri jalannya berbentuk tikungan pada sample 2 dan lurus pada sampel 1, 3 dan 5. Untuk topografi jalan berbentuk tanjakan pada sample 3 dan dataran pada sampel 1, 2 dan 4.

Kondisi JL. Teuku Umar . Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 2-3 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 0,50-8 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia mahagoni*), palem (*Dryophloeus beguinii*), keray payung (*Filicium decipiens*), bungur (*Lagerstromiia speciosa*), tanaman hias pucuk merah (*Syzygium oleana*), bunga kertas (*Bougainvillea*). Pada JL. Teuku Umar geometri jalannya berbentuk tikungan pada sample 3 dan lurus pada sampel 1, 2, 4 dan 5. Untuk topografi jalan berbentuk turunan pada sampel 1 dan 5 tanjakan pada sample 3 dan 4 dataran pada sampel 2.

Kondisi JL. Sumantri Brojonegoro. Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 1-4 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 1-8 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia Mahagoni*), Sawo kecil (*Manilkara kauki*), Sawo kecil (*Manilkara kauki*) palem (*Dryophloeus Beguinii*), kamboja (*Plumeria*), bunga kertas (*Bougainvillea*). Pada JL. Sumantri Brojonegoro geometri jalannya berbentuk perempatan pada sample 3 dan lurus pada sampel 1, 2 dan 4. topografi jalan berbentuk dataran pada keempat sampelnya.

Kondisi JL. Myjen HM Ryacudu . Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 2-3 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 1-8 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia Mahagoni*), keray payung (*Filicium decipiens*), bungur (*Lagerstromiia speciosa*), Sawo kecil (*Manilkara kauki*), tanaman hias pucuk merah (*Syzygium oleana*), bunga kertas (*Bougainvillea*). Pada JL. Myjen HM Ryacudu geometri jalannya berbentuk tikungan pada sample 2, perempatan sampel 3 dan lurus pada sampel 1 dan 4. Untuk topografi jalan berbentuk dataran pada keempat sampelnya.

Kondisi JL. Letjen Alamsya Ratuparawinegara. Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 2-3 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 2-8 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia Mahagoni*), keray payung (*Filicium decipiens*), bungur (*Lagerstromiia speciosa*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Pada JL. Letjen Alamsya Ratuparawinegara geometri jalannya berbentuk perempatan pada sampel 2 dan lurus pada sampel 1, 3 dan 4. Untuk topografi jalan berbentuk tanjakan terdapat pada sampel 4. Sampel 1, 2 dan 3 berbentuk dataran.

Kondisi JL. Sultan Agung. Kondisi tegakan pada median jalan ini memiliki jarak tanam antara 2-3 m, dengan bentuk tajuk yang berbentuk membulat dan payung dengan ketinggian tanaman berkisar 2-8 m. Jenis tanaman yang dapat ditemukan pada median jalan selain tanaman nangka ialah jenis tanaman mahoni (*Swietenia Mahagoni*), keray payung (*Filicium decipiens*), bungur (*Lagerstromiia speciosa*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*), ketapang (*Terminalia catappa*), tanaman hias pucuk merah (*Syzygium oleana*), dan bunga kertas (*Bougainvillea*). Pada JL. Letjen Alamsya Ratuparawinegara geometri jalannya berbentuk perempatan pada sampel 2 dan lurus pada sampel 1, 3 dan 4. Untuk topografi jalan berbentuk tanjakan terdapat pada sampel 4. Sampel 1, 2 dan 3 berbentuk dataran.


Nilai Kandungan Rataan Timbal Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Kandungan timbal buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung memiliki variasi yang beragam antara 0,46 - 1,94 ppm (mg/kg) namun berdasarkan rata-rata yang didapat kandungan timbal pada buah nangka di median jalan Kota Bandar Lampung tergolong tinggi dan melampaui batasan konsumsi buah, dengan rata-rata kandungan timbal pada buah nangka yaitu 1,05 ppm (mg/kg). Rataan kandungan timbal yang tergolong tinggi pada buah nangka disarankan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tidak mengonsumsi buah nangka yang berasal dari median jalan sebab dengan konsumsi jangka panjang akan mengakumulasi kandungan timbal pada tubuh manusia dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Nilai kandungan rata-rata timbal buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan rata-rata timbal buah nangka di median jalan Kota Bandar Lampung

No	No Sampel	Nama jalan	Kandungan Timbal (Pb) ppm (mg/kg)	Rataan Kandungan Timbal (Pb) ppm (mg/kg)
1	2	Jl. Kapten Abdul Haq	0,46	-
2	1	Jl. Kapten Abdul Haq	0,61	-
3	3	Jl. Kapten Abdul Haq	0,98	-
4	4	Jl. Kapten Abdul Haq	1,92	0,99
5	6	Jl. Zainal abidin Pagar A.	0,48	-
6	8	Jl. Zainal abidin Pagar A.	0,66	-
7	5	Jl. Zainal abidin Pagar A.	0,97	-
8	7	Jl. Zainal abidin Pagar A.	1,82	0,98
9	10	Jl. Teuku Umar	0,94	-
10	13	Jl. Teuku Umar	1,71	-
11	9	Jl. Teuku Umar	1,73	-
12	11	Jl. Teuku Umar	1,79	-
13	12	Jl. Teuku Umar	1,94	1,62
14	14	Jl. S. Bojonegoro	0,57	-
15	17	Jl. S. Bojonegoro	0,63	-
16	15	Jl. S. Bojonegoro	0,65	-
17	16	Jl. S. Bojonegoro	0,67	0,62
18	19	Jl. Myjen HM Ryacudu	0,60	-
19	21	Jl. Myjen HM Ryacudu	0,72	-
20	18	Jl. Myjen HM Ryacudu	0,77	-
21	20	Jl. Myjen HM Ryacudu	0,78	0,71
22	22	Jl. Letjen Alamsya R.	0,78	-
23	24	Jl. Letjen Alamsya R.	0,82	-
24	23	Jl. Letjen Alamsya R.	0,95	-
25	25	Jl. Letjen Alamsya R.	1,76	1,07
26	29	Jl. Sultan Agung	0,66	-
27	28	Jl. Sultan Agung	0,91	-
28	30	Jl. Sultan Agung	1,14	-
29	27	Jl. Sultan Agung	1,41	-
30	26	Jl. Sultan Agung	1,80	1,18
Rataan			1,05	

Sumber: Data primer (2017)

Berdasarkan Tabel 2. Nilai kandungan rata-rata timbal buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung cukup bervariasi, kandungan yang terendah adalah sebesar 0,63 ppm (mg/kg) di Jl. S. Brojonegoro dan kandungan tertinggi sebesar 1,62 ppm (mg/kg) di Jl. Teuku Umar. Rataan kandungan timbal pada buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung sebesar 1,05 ppm (mg/kg). Hal ini menunjukkan bahwa kandungan buah nangka melampaui batasan dari kandungan timbal (Badan Standardisasi Nasional Indonesia No. 7387, 2009) yaitu sebesar 0,50 ppm (mg/kg). Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kartikasari, 2016) kandungan timbal yang terdapat pada buah apel jauh lebih tinggi yaitu sebesar 9,30 ppm (mg/kg).



Gambar 1. Rata-rata kandungan timbal pada buah nangka pada media jalan Kota Bandar Lampung

Rata-rata kandungan timbal pada media jalan Kota Bandar Lampung melewati batasan yang digunakan pada (Badan Standardisasi Nasional Indonesia No. 7387, 2009) sebesar 0,50 ppm (mg/kg) sehingga disimpulkan bahwa kandungan timbal pada buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung telah melewati batasan yang digunakan pada SNI No.7387 sebesar 0,05 ppm (mg/kg) sehingga bahwa buah nangka dari lokasi tersebut tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kelayakan Konsumsi Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Standar kelayakan konsumsi buah nangka ditetapkan menggunakan (Badan Standardisasi Nasional Indonesia No. 7387, 2009) mengenai batasan maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Batasan standar Pb ialah 0,50 ppm (mg/kg) sehingga dari 30 sampel yang digunakan hanya terdapat 2 sampel yang dibawah standar sehingga masih layak untuk dikonsumsi, 2 sampel ini merupakan sampel pada jalan Jl. Kapten Abdul Haq dan Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, pada Jl. Kapten Abdul Haq yang merupakan sampel ke-2 dengan kandungan timbal pada buah yaitu 0,48 ppm (mg/kg) tinggi pohon 5,5 m, diameter batang pohon 20,06 cm, dengan kelembatan daun yang lebat, ketinggian buah pohon 0,20 m, usia pohon relatif sama yaitu 6 tahun, kandungan udara sekitar pohon 462 ppm, terdapat keberadaan pohon lain disekitarnya, jumlah kepadatan lalu lintas sebanyak 48,551 /hari, jarak pohon dari lampu merah yaitu 0,22 km atau sama dengan 220 m, bentuk topografi tikungan, bentuk geometri dataran, lebar jalan 3,50 m dan jumlah lajur jalan yaitu 2 lajur. Di jalan Jl. Zainal Abidin Pagar Alam yang merupakan sampel ke-6 dengan kandungan timbal pada buah yaitu 0,48 ppm (mg/kg) , tinggi pohon 2,50 m, diameter batang pohon 9,55 cm , dengan kelembatan daun yang tidak lebat, ketinggian buah pohon 0,90 cm, usia pohon relatif sama yaitu 6 tahun, kandungan udara sekitar pohon 479 ppm, terdapat keberadaan pohon lain disekitarnya, kepadatan lalu lintas sebanyak 70,985 kendaraan/hari, jarak pohon dari lampu merah yaitu 0,86 km atau sama dengan 860 m, bentuk topografi tikungan, bentuk geometri dataran, lebar jalan 9 m dan jumlah lajur jalan lainnya dari 2 lajur tepatnya 3 lajur jalan.

Nilai Rata-Rata Kandungan Timbal Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) Berdasarkan Topografi Jalan Dan Geometri Jalan. Berdasarkan data yang didapatkan dalam pengelompokan kandungan timbal sesuai topografi dan geometri jalan maka didapatkan hasil sebagai berikut :


Tabel 3. Nilai kandungan Rata-rata timbal buah nangka pada tiap bentuk topografi dan geometri jalan Kota Bandar Lampung

No	Bentuk Topografi dan Geometri Jalan	Rata-rata Kandungan Timbal Pada buah nangka (ppm mg/kg)
1.	Tikungan	0,7979
2.	Perempatan	0,7845
3.	Lurusan	1,1878
4.	Tanjakan	1,7393
5.	Turunan	1,6202
6.	Dataran	0,7315

Sumber: Data primer (2017).

Dengan rata-rata kandungan timbal pada tiap bentuk geometri dan topografi jalan memiliki kandungan yang berbeda dan beragam menunjukkan bahwa setiap bentuk jalan memiliki keterkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan atas kandungan timbal pada tiap buah yang berada pada median jalan, sebab tiap bentuk jalan baik topografi atau geometri akan mempengaruhi kecepatan angin, kecepatan kendaraan hingga kepadatan lalu lintas pada lokasi tersebut. Seperti pada kondisi topografi yang membentuk tikungan maka akan terjadi suatu pemecahan kandungan timbal diudara yang diakibatkan terhempas oleh kecepatan angin yang dibawa oleh kendaraan pada saat kondisi jalan lurus (Nauli, 2002 & Muziansyah, 2015)

Kandungan dari buah nangka dipengaruhi oleh bentuk geometri dan topografi jalan sehingga hal ini akan mempengaruhi dari kondisi kecepatan angin dan kecepatan kendaraan (Badan Standarisasi Nasional No.T-14, 2004 & Muziansyah, 2015) selain itu menurut (Kusminingrum *et al.*, 2008) kondisi jalan yang lengan dan lurus akan mempengaruhi kondisi kandungan dan penumpukan emisi dalam suatu lokasi sebab kendaraan akan melaju cepat. Namun pada kondisi geometri jalan yang berbentuk tanjakan kendaraan akan mengalami kinerja yang lebih berat dan pengemudi akan menginjak pedal gas lebih dalam sehingga kendaraan akan menghasilkan emisi yang lebih besar, hal ini terjadi apabila jalan tersebut tidak dalam kondisi ramai dan macet, apabila jalan dalam kendaraan ramai dan macet kendaraan akan jauh lebih berat melakukan aktifitas kerja mesin kendaraan dan dengan rentan waktu keberadaan kendaraan yang jauh lebih lama (Kusminingrum *et al.*, 2008 & (Muziansyah, 2015).



Gambar 2. Rata-rata Kandungan timbal pada tiap bentuk jalan

Kandungan timbal (Pb) pada tiap bentuk jalan baik topografi dan geometri memiliki rata-rata diatas 0,50 ppm (mg/kg) namun tiap kandungan pada bentuk jalan memiliki Variasinya masing-masing karna terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi landungan timbal pada tiap bentuk median jalan.

Variabel Berpengaruh. Terdapat Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kandungan timbal buah nangka antaranya ialah; Usia Pohon, berdasarkan penelitian (Arman *et al.*, 2010) semakin tua usia dari tanaman maka akan mempengaruhi kandungan timbal yang terdapat pada tanaman tersebut hal ini disebabkan oleh terakumulasinya kandungan timbal seusia dari tanamn tersebut. Geometri jalan bentuk tikungan dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan sebab saat kendaraan melaju pada jalur lurus memecah kumpulan CO₂ dan emisi kendaraan sehingga akan memecah kumpulan dari CO₂ dan emisi kendaraan (Badan Standarisasi Nasional No.T-14, 2004).

Topografi Jalan bentuk tanjakan dan turunan, akan terjadi kemacetan dan terjadi penumpukan kendaraan dan mengakumulasi jumlah emisi yang dihasilkan dan pada kondisi jalan menanjak pengendara akan sering menekan pedal gas lebih dalam, kedua hal ini yang mengakibatkan kandungan timbal akan dihasilkan lebih banyak dan mempengaruhi kandungan pada buah nangka hal ini disebabkan karna kecepatan kendaraan akan meningkat, menurun, atau tetap. kecepatan kendaraan yang tinggi akan menghasilkan emisi kendaraan yang lebih besar namun dengan waktu yang cepat namun dengan kendaraan dengan kecepatan yang lambat akan menghasilkan emisi yang besar (Muziansyah, 2015 & PT. Delima Laksana Tata, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa buah nangka yang diperoleh dari median jalan tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Bandar Lampung karena memiliki rata-rata kandungan timbal sebesar 1,05 ppm (mg/kg). Kandungan timbal buah nangka pada median jalan Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor, usia pohon, topografi jalan bentuk tikungan, geometri jalan bentuk tanjakan, dan geometri jalan bentuk turunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, B. Dan Fatimah, N. 2010. Pengaruh Umur Eceng Gondok (*Eichernia Crassipes*) Dan Genjer (*Limnocharius Flava*) Terhadap Penyerapan Logam Pb, Cd Dan Cu Dalam Ember Perlakuan Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom. *Jurnal Fermasains*, 1(2): 60–70.
- Badan Standardisasi Nasional Indonesia No. 7387 2009. *Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Badan Standardisasi Indonesia*. Jakarta, Indonesia.
- Badan Standarisasi Nasional No.T-14 2004. *Geometri Jalan Perkotaan*. Jakarta, Indonesia.
- BPSBL 2014. *Jumlah kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung*.
- Dahlan, E.N. 2008. JUMLAH EMISI GAS CO₂ DAN PEMILIHAN JENIS TANAMAN BERDAYA ROSOT SANGAT TINGGI: STUDI KASUS DI KOTA BOGOR (The Amount of CO₂ Gasses Emission and Selection of Plant Species with Height Carbon Sink Capability : Case Study in Bogor Municipality). *Jurnal Media Konservasi*, 13(2): 85–89.
- Kartikasari, M. 2016. *Analisis Kandungan Timbal (Pb) Pada Buah Apel (Pylus Malus L.) Dengan Metode Dekstruksi Basah Secara Spektrofotometri Serapan Atom*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kusminingrum, N. & Gunawan G. 2008. Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor Di Jalan PerKotaan Pulau Jawa Dan Bali. *Jurnal RSDD*, 5(1): 47–59.
- Law, A.M, & Kelton, W.D. 1991. *Simulation Modeling Analisis*. Singapore: Universitas of Arizona.
- Maksum, T.S. 2013. KANDUNGAN CADMIUM DAN TIMBAL BUAH MANGROVE *Bruguiera gymnorrhiza*, *Avicennia alba* DAN *Sonneratia caseolaris* DARI MUARA SUNGAI MATI. *Jurnal CAKRA KIMIA*, 3(3): 84–88.

Rama Wicaksa: *Identifikasi kandungan logam timbal (pb) pada buah nangka (Artocarpus heterophyllus) ..*

Muziansyah, D, dkk. 2015. Model Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi (Studi Kasus : Terminal Pasar Bawah Ramayana Koita Bandar Lampung) Terminal Pasar Bawah Ramayana kota bandar lampung. *Model Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi (Studi Kasus: Terminal Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar Lampung)*, 3(1): 57–70.

Nauli, T. 2002. POLA SEBARAN POLUTAN DARI CEROBONG ASAPPOLA SEBARAN POLUTAN DARI CEROBONG ASAP. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir P3TM-BATAN*. hal.313–320.

PT. Delima Laksana Tata 2012. *Studi Perhitungan Emisi CO2 Pada Setiap Kendaraan Bermotor. Program*. Jakarta, Indonesia.

Rukman, R. 1998. *Tanaman nangka*. Yogyakarta, Indonesia.

Widyasari, N., Moelyaningrum, A.D. & Pujiati, R.S. 2013. ANALISIS POTENSI PENCEMARAN TIMBAL (Pb) PADA TANAH , AIR LINDI DAN AIR TANAH (SUMUR MONITORING) DI TPA PAKUSARI KABUPATEN JEMBER Analysis of Potential Lead Pollution on Soil , Leachate and Ground Water (MonitoringWells) in Pakusari Landfill Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. hal.1–8.

Witoelar R. 2005. Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia Proceeding of Fuel Quality Monitoring in 10 Big Cities in Indonesia Pendahuluan Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia Proceeding of Fuel Quality Monito. *Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia*. hal.1–60.

Arman, B. Dan Fatimah, N. 2010. Pengaruh Umur Eceng Gondok (*Eichernia Crassipes*) Dan Genjer (*Limnocharius Flava*) Terhadap Penyerapan Logam Pb, Cd Dan Cu Dalam Ember Perlakuan Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom. *Jurnal Fermasains*, 1(2): 60–70.

Badan Standardisasi Nasional Indonesia No. 7387 2009. *Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan*. Badan Standardisasi Indonesia. Jakarta, Indonesia.

Badan Standarisasi Nasional No.T-14 2004. *Geometri Jalan Perkotaan*. Jakarta, Indonesia.

BPSBL 2014. *Jumlah kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung*.

Dahlan, E.N. 2008. JUMLAH EMISI GAS CO 2 DAN PEMILIHAN JENIS TANAMAN BERDAYA ROSOT SANGAT TINGGI: STUDI KASUS DI KOTA BOGOR (The Amount of CO 2 Gasses Emission and Selection of Plant Species with Height Carbon Sink Capability : Case Study in Bogor Municipality). *Jurnal Media Konservasi*, 13(2): 85–89.

Kartikasari, M. 2016. *Analisis Kandungan Timbal (Pb) Pada Buah Apel (Pylus Malus L.) Dengan Metode Dekstruksi Basah Secara Spektrofotometri Serapan Atom*. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Kusminingrum, N. & Gunawan G. 2008. Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor Di Jalan PerKotaan Pulau Jawa Dan Bali. *Jurnal RSDD*, 5(1): 47–59.

Law, A.M, & Kelton, W.D. 1991. *Simulation Modeling Analisis*. Singapore: Universitas of Arizona.

Maksum, T.S. 2013. KANDUNGAN CADMIUM DAN TIMBAL BUAH MANGROVE *Bruguiera gymnorrhiza*, *Avicennia alba* DAN *Sonneratia caseolaris* DARI MUARA SUNGAI MATI. *Jurnal CAKRA KIMIA*, 3(3): 84–88.

Muziansyah, D, dkk. 2015. Model Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi (Studi Kasus : Terminal Pasar Bawah Ramayana Koita Bandar Lampung) Terminal Pasar Bawah

Ramayana kota bandar lampung. *Model Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi (Studi Kasus: Terminal Pasar Bawah Ramayana Kota Bandar Lampung)*, 3(1): 57–70.

Nauli, T. 2002. POLA SEBARAN POLUTAN DARI CEROBONG ASAPPOLA SEBARAN POLUTAN DARI CEROBONG ASAP. *Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir P3TM-BATAN*. hal.313–320.

PT. Delima Laksana Tata 2012. *Studi Perhitungan Emisi CO2 Pada Setiap Kendaraan Bermotor. Program*. Jakarta, Indonesia.

Rukman, R. 1998. *Tanaman nangka*. Yogyakarta, Indonesia.

Widyasari, N., Moelyaningrum, A.D. & Pujiati, R.S. 2013. ANALISIS POTENSI PENCEMARAN TIMBAL (Pb) PADA TANAH , AIR LINDI DAN AIR TANAH (SUMUR MONITORING) DI TPA PAKUSARI KABUPATEN JEMBER Analysis of Potential Lead Pollution on Soil , Leachate and Ground Water (MonitoringWells) in Pakusari Landfill Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. hal.1–8.

Witoelar R. 2005. Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia Proceeding of Fuel Quality Monitoring in 10 Big Cities in Indonesia Pendahuluan Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia Proceeding of Fuel Quality Monito. *Prosiding Pengujian Kualitas Bahan Bakar di 10 Kota Besar di Indonesia*. hal.1–60.