Jurnal Geofisika Eksplorasi

E-ISSN 2685-6182 P-ISSN 2356-1599

Vol. 06 No.02, July 2020



Geophysical Engineering Department Engineering Faculty

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Ilmiah	: Jurnal Nasional
Judul	: Interpretasi Bidang Gelincir Paleo-Rockslide Parangtritis Menggunakan Metode Geofisika Audio Magneto-Telluric (AMT)
Penulis	: Akroma Hidayatika, S.T., M.Eng
NIP	: 199008052019032014
Instansi	: Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung
Publikasi	 Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol. 06 No. 02, July 2020 E-ISSN 2685-6182 P-ISSN 2356-1599
URL Online	: INTERPRETASI GEOFISIKA BIDANG GELINCIR PALEO-ROCKSLIDE PARANGTRITIS Hidayatika Jurnal Geofisika Eksplorasi (unila.ac.id)

Bandar Lampung, 18 Maret 2021

Mengetahui. Dekan Fakultas Teknik

Prof. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN.Eng. NIP 196207171987031002

Penulis,

Akroma Hidayatika, S.T., M.Eng. NIP 199008052019032014

Men LPPM Um LPPM Um PENDIDIRAN Ogi STAS 27 7 Menyetujui, Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A NIP 196505101993032008

ar



LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	: Interpretasi Bidang Gelincir Metode Geofisika Audio Ma	Paleo-Rockslide Parangtritis Menggunakan gneto-Telluric (AMT)
Jumlah Penulis	: 5 Orang	
Nama-nama Penulis	: Akroma Hidayatika, Suharno	o, Rahmi Mulyasari, Hesti, Bella R. Juliarka
Status Penulis	: Penulis Pertama dan Penulis	Koresponden
Identitas Jurnal Ilmiah	: a. Nama jurnal	: Jurnal Geofisika Eksplorasi
	b. Nomor ISSN	: E 2356-1599 dan P 2685-6182
	c. Vol., No., Bulan, Tahun	: Vol. 06, No. 02, July 2020
	d. Penerbit	: Universitas Lampung
	e. DOI Artikel (jika ada)	: Registration
	f. Alamat Web Jurnal	: Jurnal Geofisika Eksplorasi (unila ac id)
	g. Terindeks di	: SINTA 4
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah	: Jurnal Ilmiah Internasi	onal / Internasional Bereputasi **)
(contraining of young of puttin)	Inernal Ilmich Masional	Tarakraditasi

filman Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN (Peer Review)

			Nilai Maksimal JURN/	simal JURNA	LILMIAH	Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
No	Komponen Yang Dinilai Internasional / Bereputasi T	Komponen Yang Dinilai		Nasional Terakreditasi	Nasional ***)	
1	Kelengkapan unsur isi karya	(10%)		2		2
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	(30%)		6		6
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi	(30%)		6		5,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan	(30%)		6		6
	Total	100%		20		19.5

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer :

unpur harry rlunes sanget memadai, pembaharan mendelam berdasarkan Arat. Interpretasi bidang getiner'r dyn AMT mempahan hal 33 barn dan perlu dilembanglean tualitas jurnal sudeh sangat baile.

Bandar Lampung, 10 Mei 2021

REVIEWER : 1 / 2 **)

Nama NIP

Unit Kerja

: Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T : 197209281999031001 : Jurusan Ceknik Geofisika

Tanda Tangan

-

- dinilai oleh 2 (dua) Reviewer secara terpisah. *) coret yang tidak perlu.

Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) Jumlah Penulis Nama-nama Penulis Status Panulis	 Interpretasi Bidang Gelincir Paleo-Rockslide Parangtritis Menggunakan Metode Geofisika Audio Magneto-Telluric (AMT) 5 Orang Akroma Hidayatika, Suharno, Rahmi Mulyasari, Hesti, Bella R. Juliarka Penulis Pertama dan Penulis Koresponden
Identitas Jurnal Ilmiah	a.Nama jurnal: Jurnal Geofisika Eksplorasib.Nomor ISSN: E 2356-1599 dan P 2685-6182c.Vol., No., Bulan, Tahun: Vol. 06, No. 02, July 2020d.Penerbit: Universitas Lampunge.DOI Artikel (jika ada): Registrationf.Alamat Web Jurnal: Jurnal Geofisika Eksplorasi (unila ac id)g.Terindeks di: SINTA 4
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri tanda √ yang dipilih)	 Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN (Peer Review):

	o Komponen Yang Dinilai		Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			
No			Internasional / Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nusional ***)	Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
1	Kelengkapan unsur isi karya	(10%)		2		2
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	(30%)		6		s,7
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi	(30%)		6		5,3
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan	(30%)		6		6
	Total	100%		20		19

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer :

Bandar Lampung, 10 Mei 2021

REVIEWER : 1 / 2 **)

Nama : Prof. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN.Eng NIP : 196207171987031002

Unit Kerja

: Jurusan Teknik Geofisika

Tanda Tangan

*) dinilai oleh 2 (dua) Reviewer secara terpisah.

**) coret yang tidak perlu.

***) Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR HASIL PENILAIAN GABUNGAN SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Yang bertan	da tangan di bawa	h ini:			
Nama NIP Jabatan Unit Kerja	: Prof. Drs. Ir. : 1962071719 : Dekan : Fakultas Tek	Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN 87031002 nik Universitas Lampung	Eng.		
Dengan ini r	nenerangkan bahw	/a;			
Judul Karya I Jumlah Penul Nama-nama I Status Penulis Identitas Jurn	lmiah (Artikel) is Penulis al Ilmiah	 Interpretasi Bidang Gelinei Metode Geofisika Audio Mag 5 Orang Akroma Hidayatika, Suharno Penulis Pertama / Penulis k a. Nama jurnal b. Nomor ISSN c. Vol., No., Bulan, Tahun d. Penerbit e. DOI Artikel (jika ada) f. Alamat Web Jurnal 	ir Paleo-Rockslide meto-Telluric (AMT , Rahmi Mulyasari, I e / Penulis K : Jurnal Geofisika : E 2356-1599 dar : Vol. 06, No. 02, : Universitas Lam : Registration : Jurnal Geofisik	Parangtritis lesti, Bella R orespondensi Eksplorasi p 2685-6182 July 2020 pung a Eksplorasi	Menggunakan Juliarka **) 2 (unila.ac.id)
Kategori Publ (beri tanda √	ikasi Jurnal Ilmiah <i>yang dipilih)</i>	 g. Terindeks di : Jurnal Ilmiah Internasi Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Ilmiah Nasional 	: SINTA 4 ional / Internasional I I Terakreditasi I / Nasional terindeks	Bereputasi **	*)

HASIL PENILAIAN (Peer Review):

N o	Komponen Yang Dinilai		Nilai Reviewer I Prof. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN.Eng	Nilai Peer Reviewer 2 Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T	Nilai Rata-Rata
1	Kelengkapan unsur isi karya	(10%)	2	2	2
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	(30%)	5,7	6	5,85
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi	(30%)	5,3	5,5	5,4
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan	(30%)	6	6	6
	Total	100%	19	19,5	19,25

Nilai Pengusul = BP x NP = 19,25 X 60 = 11,5

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 ubagi jumlah anggota



Table of Contents

Articles

<u>Cover</u> Editor JGE	<u>PDF</u> 87
Foreword July 2020 Editor JGE	<u>PDF</u> 88-90
<u>Identifikasi Lapisan Akuifer Menqqunakan Metode Seismik Refraksi di Desa Jatimulyo,</u> <u>Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan</u> Rhahmi Adni Pesma, Mokhammad Puput Erlangga, Intan Adiani Putri, Risky Martin Antosia, Ruhul Firdaus, Gestin Mey Ekawati	<u>PDF</u> 91-100
<u>OPTIMALISASI PENCITRAAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE</u> <u>KIRCHHOFF PRE-STACK TIME MIGRATION PADA DATA SEISMIK LAUT WETAR</u> Syamsurijal Rasimeng, Amelia Isti Ekarena, Bagus Sapto Mulyanto, Subarsyah Subarsyah, Andrian Wilyan Djaja	<u>PDF</u> 101-112
<u>Analisis Model Kecepatan Gelombang-P pada Coal-Seam Gas Studi Kasus Cekungan Sumatera</u> <u>Selatan, Indonesia</u> Harnanti Yogaputri Hutami, Fitriyani Fitriyani, Tiara Larasati Priniarti, Handoyo Handoyo	PDF 113-120
INTERPRETASI GEOFISIKA BIDANG GELINCIR PALEO-ROCKSLIDE PARANGTRITIS Akroma Hidayatika, Suharno Suharno, Rahmi Mulyasari, Hesti Hesti, Bella Restu Juliarka	<u>PDF</u> 121-130
<u>ANALISIS DEFORMASI PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE DInSAR (Differential</u> <u>Interferometry Synthetic Aperture Radar) PADA STUDI KASUS GEMPABUMI LOMBOK PERIODE</u> <u>AGUSTUS 2018</u> Muhammad Fikri Azhari, Karyanto Karyanto, Syamsurijal Rasimeng, Bagus Sapto Mulyanto	<u>PDF</u> 131-144
<u>IDENTIFIKASI PATAHAN DI DESA TAMAN AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK</u> <u>BARAT MENGGUNAKAN METODE GEOMAGNET</u> Deni Hermansyah, Bakti Sukrisna, Suhayat Minardi	<u>PDF</u> 145-155
STRUKTUR GEOLOGI DAN VULKANOSTRATIGRAFI; PENDEKATAN MODEL ELEVASI DIGITAL DAN CITRA LANDSA Hari Wiki Utama	<u>T 8</u>

Vol. 06, No. 02, July 2020, 121-130



https://doi.org/10.23960/jge.v6i2.75

INTERPRETASI BIDANG GELINCIR PALEO-ROCKSLIDE PARANGTRITIS MENGGUNAKAN METODE GEOFISIKA AUDIO MAGNETO-TELLURIC (*AMT*)

PARANGTRITIS PALEO-ROCKSLIDE SLIP SURFACE INTERPRETATION USING AUDIO MAGNETO-TELLURIC (AMT) GEOPHYSICAL METHOD

Akroma Hidayatika^{1*}, Suharno², Rahmi Mulyasari³, Hesti⁴, Bella R Juliarka⁵

¹²³⁴Teknik Geofisika Universitas Lampung; Jl. Soemantri Brodjonegoro No 1 Gedong Meneng, Bandar Lampung; telp (0721) 704947

⁵Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera; Jl. Terusan Rasyudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan; telp (0721) 8030188

Received: 2020, 06th June Accepted: 2020, 03rd July

Keyword:

Paleo-rockslide; Audio-MagnetoTelluric; Parangtritis.

Corespondent Email: akr_tika@yahoo.co.id

How to cite this article:

Hidayatika, A., Suharno, Mulyasari, R., Hesti, & Juliarka, B.R. (2020). Interpretasi Bidang Gelincir *Paleo-Rockslide* Menggunakan Metode Geofisika *Audio Magneto-Telluric* (AMT). *Jurnal Geofisika Eksplorasi*, 6(2), 121-130. Abstrak. Parangtritis memiliki area dengan resiko jatuhan batuan (rockslide) dengan tingkat menengah hingga tinggi. Parangtritis juga memiliki paleorockslide dalam skala besar yakni melibatkan lebih dari 800 juta m³ massa batuan dengan area 1500 m x 2700 m. Hal tersebut merupakan salah satu faktor perubahan bentang alam yang signifikan. Penelitian ini menggunakan 9 titik data primer Audio-Magneto Telluric (AMT). Menggunakan jarak antar titik 750 m membentuk lintasan persegi 2 km x 2 km. Lokasi penelitian fokus pada sisi barat area paleo-rockslide di Desa Parangtritis. Pengolahan data AMT menggunakan bantuan perangkat lunak MT-INV dan RockWorks. Hasil inversi satu dimensi terdiri dari 3 lapisan. Menunjukkan nilai resistivitas rendah (0-10 Ω m) diinterpretasikan sebagai endapan pantai dan gumuk pasir, resistivitas sedang (50 - 160 Ωm) untuk batugamping Wonosari dan resistivitas tinggi (> 170 \Om) untuk breksi andesit Nglanggran. Ketebalan rata-rata lapisan pertama 44 m dan lapisan kedua mencapai 175 m. Berdasarkan struktur resistivitas dari data AMT, interpretasi kontak batas antara batugamping Wonosari dan breksi andesit Nglanggran dapat berperan sebagai bidang gelincir dikedalaman sekitar 250 m. Bidang ini merupakan bidang sesar pasif yang dikontrol sesar Girijati di timur daerah penelitian.

Abstract. Parangtritis has a rock fall hazard area with a medium to high level of risk. In Parangtritis, there was a large-scale paleo-rockslide that involved more than 800 million m^3 of rock mass with an area of 1500 m x 2700 m. This is a significant factor in changing the landscape. This research uses 9 Audio-Magneto Telluric (AMT) primary data points. Using the distance between points 750 m within a 2 km x 2 km study area. The location focused on the western side of the paleo-landslide area in Parangtritis Village. Processing AMT data using the help of MT-INV and RockWorks software. The result of one-dimensional inversion consists of 3 layers. Indicates a low resistivity value (0-10 Ω m) interpreted as beach deposition and sand dune, medium resistivity (50 - 160 Ω m) for Wonosari limestone and high resistivity (> 170 Ω m) for Nglanggran

© 2020 JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC)

andesite breccias. The average thickness of the first layer is 44 m and the second layer reaches 175 m. Based on the resistivity structure of the AMT data, the interpretation of the boundary contact between the Wonosari limestone and the Nglanggran andesite breccia can act as a slip field in a depth of about 250 m This field is a passive fault field controlled by the Girijati fault in the east of the study area.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan klasifikasi (Varnes, 1978) istilah paleo-rockslide dapat didefinisikan sebagai kejadian jatuhan batuan keras yang melibatkan tanah longsor, yang telah lampau dalam kurun waktu geologi. Menurut Husein dan Srijono (2007) kejadian paleo-rockslide di Parangtritis diperkirakan terjadi selama Plio-Pleistosen dengan melibatkan lebih dari 800 juta m³ massa batuan dengan area 1500 m x 2700 m. Melihat besarnya kejadian, tentunya akan lebih baik jika memiliki data yang lebih banyak dalam mengkaji paleo-rockslide di area ini. Seperti data fisik batuan dalam jumlah besar tanpa melakukan pemboran atau perusakan tersebut dapat alam. Data diperoleh menggunakan metode geofisika Magnetotelurik (MT). Pada penelitian sebelumnya, Husein dkk. (2007) menggunakan data MT sebanyak 2 titik untuk menginterpretasikan kontak stratigrafi lapisan breksi andesit dan batu kapur dengan jelas di area Parangtritis.

Magnetotelurik (MT) adalah metode geofisika pasif yang mengukur variasi waktu medan listrik dan medan magnet alami di permukaan bumi (Cagniard, 1953). Metode ini memanfaatkan sifat fisika batuan yaitu, resistivitas. Metode MT yang mampu mengukur resistivitas batuan dan memiliki efisiensi tinggi salah satunya adalah metode Audio-Magneto Telluric atau AMT (Berktold, 1983). Metode AMT menggunakan gelombang elektromagnetik alami berfrekuensi 8 Hz - 20 kHz (Cagniard, 1953). Metode ini mampu memberikan informasi kedalaman hingga ± 2 km pada titik tertentu (Hoover & Long, 1976).

Berdasarkan para peneliti terdahulu, metode MT merupakan metode yang efisien dalam menentukan batas perlapisan batuan dan struktur geologi, tentunya akan dapat pula digunakan untuk menentukan bidang gelincir dari longsor purba. Oleh karena pada umumnya bidang gelincir dari *rockslide* berupa struktur sesar atau kekar yang melibatkan kontak antar perlapisan. Penggunaan data AMT sebanyak 9 titik diharapkan mampu memberikan informasi lebih mengenai struktur resistivitas hingga kedalaman bidang dasar sesar (*failure base plane*) atau bidang gelincir dari *paleo-rockslide* Parangtritis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Paleo-rockslide Parangtritis

Husein dkk. (2007) memaparkan bahwa pada ujung selatan Bentang Baturagung, didekat Pantai Parangtritis Yogyakarta terdapat paleo-landslide (yang selanjutnya disebut paleorockslide karena istilah ini lebih tepat untuk longsoran di Parangtritis) dalam skala besar. Dikatakan batuan longsor-purba (paleorockslide) karena kejadian sliding diperkirakan selama masa Plio-Pleistosen (Gambar 1). Interpretasi waktu sliding didasarkan oleh informasi stratigrafi dan morfologi. Karena rockslide ini melibatkan batu kapur Wonosari sebagai unit batu termuda, tentunya kejadian rockslide harus setelah pengendapan batuan ini. Oleh karena itu, kejadian harus berlangsung selama pengangkatan karena mekanisme utamanya adalah sesar normal dengan strikeslip.

Peristiwa ini bergerak ke arah selatan, dan membentuk perubahan bentang alam yang signifikan. Kejadian ini melibatkan topografi seluas 2,7 km x 1,5 km yang dibatasi oleh dua buah sesar yang sejajar berarah utara-selatan. Kedua sesar tersebut termasuk dalam Sistem Sesar Opak. Sesar batas timur disebut Sesar Girijati (**Gambar 2**), yang merupakan pengontrol utama pergerakan massa dan pembentukaan tebing-tebing curam di area ini (Husein dkk., 2007).



Gambar 1. Peta Geologi area *paleo-rockslide* Parangtritis yang dibatasi sesar Girijati dan sesar Parangtritis, penyederhanaan dari Rahardjo dkk. (1995) oleh Husein dkk. (2007). Penelitian hanya mencakupi sisi bagian barat area *paleo-rockslide*. Tmn: Formasi Nglanggran, Tmw: Formasi Wonosari, Qmi: Endapan Gunungapi Muda Merapi, Qa: Alluvial. Garis hitam: sesar, Garis hitam putus-putus: sesar terduga



Gambar 2. Citra satelit area paleo-rockslide Parangtritis; garis putih pada b. Sesar batas (Husein dkk., 2007)

Data geologi permukaan sangat dibutuhkan dalam interpretasi data geofisika dalam mengidentifikasi litologi bawah permukaan. Breksi andesit Nglanggran ditemukan di sepanjang bagian utara hingga bagian barat daerah penelitian. Penamaan satuan ini berdasarkan dominasi breksi andesit yang ditemukan di lapangan. Hubungan satuan breksi andesit dengan satuan batugamping di atasnya adalah ketidakselarasan. Breksi andesit Nglanggran berwarna abu-abu kecoklatan dengan ukuran dari pasir hingga bongkah berstruktur masif, sortasi buruk dan kemas terbuka. Batuan ini tersingkap di permukaan pada titik pengukuran AMT 1 dan AMT 5. Komposisi fragmen andesit dan matriknya berupa material-material berukuran pasir. Satuan breksi andesit di daerah penelitian dapat dikatakan sebagai penyusun utama Formasi Nglanggran yang diendapkan pada Miosen Awal sampai Miosen Tengah (Raharjo, 1995).

Batugamping Wonosari tersingkap pada titik pengukuran AMT 3, 6 dan 9 berada pada satuan topografi berlereng sedang hingga sangat curam. Secara geomorfologi menurut Karlina (2014) batugamping ini membentuk bukit karst, menurut Husein dan Srijono (2007) termasuk dalam satuan pegunungan struktural terbiku sedang hingga terbiku tinggi. Jika diamati lebih lanjut dari DEM, satuan ini dapat lebih tepat berada pada perbukitan struktural. Satuan batugamping ini menumpang secara tidak selaras di atas satuan breksi andesit. Batugamping ini berwarna abu-abu kecoklatan sebagian, dan lainnya berwarna kekuningan (dapat disebut sebagai batugamping terumbu). Sebagian besar berukuran pasir kasar, bertekstur klastik dengan komposisi mineral kalsit sedangkan menurut Juliarka (2017) berkomposisikan mineral karbonat dengan struktur masif. Berdasarkan kenampakan megaskopis tersebut maka satuan batugamping ini termasuk kedalam Formasi Wonosari yang berumur Miosen Tengah hingga Pliosen (Raharjo, 1995).

Endapan pantai yang berupa pasir tersingkap di titik pengukuran AMT 6, AMT 7 dan AMT 8. Butir pasir berukuran halus hingga sedang ditemukan pada daerah yang berada dekat pantai, vaitu pada bagian barat dava daerah penelitian. Endapan ini berwarna abuabu kehitaman dan material pasirnya saling lepas satu sama lainnya. Menurut Rahardjo dkk. (1995) sumber endapan ini adalah aktivitas Gunung Merapi dan hasil lepasan material batuan lain yang lebih tua yang terbawa aliran sungai hingga bermuara ke pantai. Mineral yang banyak dijumpai adalah mineral dengan tingkat resistensi yang tinggi terutama pada mineral-mineral berat. Struktur yang banyak ditemukan pada endapan pantai berupa struktur *ripple mark*.

2.2. Audio Magneto-Telluric (AMT)

Informasi mengenai konduktivitas medium dalam data MT diperoleh dari penyelesaian persamaan Maxwell. Berdasarkan Cagniard (1953), pengukuran variasi medan listrik (E) dan medan magnet (H) yang saling tegak lurus akan menghasilkan impedansi (perbandingan E dan H). Impedansi menggambarkan sifat kelistrikan bawah permukaan bumi (Cagniard, 1953), dirumuskan sebagai berikut:

$$Z_{xy} = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{i \,\omega \,\mu_o \,\rho} \tag{1}$$

$$Z_{yx} = \frac{E_y}{H_x} = -\sqrt{i \,\omega \,\mu_o \,\rho} \tag{2}$$

dengan Z merupakan impedansi, sedangkan x dan y arah secara respektif. Impedansi dapat pula dinyatakan sebagai besaran resistivitas ρ dan fasa φ, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\rho = \frac{\left|Z_{ij}\right|^2}{\omega\,\mu_o}\tag{3}$$

$$\varphi_{ij} = tan^{-1} \frac{Im[Z_{ij}]}{Re[Z_{ij}]} \tag{4}$$

dengan $\omega = 2\pi f$ dan μ_o merupakan permitivitas magnetik.

Dalam memperkirakan kedalaman penetrasi atau kedalaman investigasi

gelombang EM menggunakan besaran *skin depth* δ . Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\,\mu_o}} \tag{5}$$

Model 1-D direpresentasikan dari nilai resistivitas terhadap kedalaman. Model yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki resistivitas konstan atau homogen dan isotropis (Cagniard, 1953). Parameter model berupa resistivitas tiap lapisan dengan lapisan terakhir medium homogen (Vozoff, 1991).

Konduktivitas (σ) atau resistivitas (ρ = 1/ σ) merupakan kemampuan suatu medium untuk dilalui muatan listrik. Aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat di golongkan menjadi tiga macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara elektrolitik, dan konduksi secara dielektrik (Caldwell dkk., 1986).

Sebagian besar batuan merupakan konduktor yang buruk dan memiliki resistivitas vang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya batuan biasanya bersifat porous dan memiliki pori-pori yang terisi oleh fluida, terutama air. Akibatnya batuan-batuan tersebut menjadi konduktor elektrolitik, dimana konduksi arus listrik dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam air. Konduktivitas dan resistivitas batuan porous bergantung pada volume dan susunan pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan bertambah banyak, dan sebaliknya resistivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan berkurang (Caldwell dkk., 1986).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari survei geofisika *Audio Magnetotelurik* (AMT). Titik ukur AMT berjumlah 9 titik. Pada area penelitian seluas 2 x 2 km² dengan ketinggian antara 5 hingga 100 m di atas permukaan laut. Koordinat batas area penelitian adalah UTM 428000-9116000 hingga UTM 424000-9112500. Survey menggunakan metode MT dilakukan dengan mengukur dua

komponen tegak lurus horizontal (x dan y) dari medan listrik (E) dan medan magnetik (B) juga komponen vertikal (z) medan magnetik (B) sehingga total lima komponen. Cara pemasangan sistem penerima pada alat Stratagem dapat dilihat pada **Gambar 3.**



AMT

Perekaman data saat akuisisi AMT menggunakan stratagem terdiri dari 3 band frekuensi. yaitu band 1 (10Hz-1kHz) menunjukkan target yang dalam, band 2 (500 Hz-3kHz) menunjukkan target kedalaman sedang, dan band 3 (750Hz-92kHz) menunjukkan target yang dangkal. Sedangkan keluaran data dari stratagem merupakan hasil perhitungan impedansi pada arah X dan Y berupa data frekuensi, koherensi, apparent resistivity (resistivitas semu) dan fase.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan hasil inversi 1-D dari perangkat lunak MTINV sebagai masukan program untuk di visualkan dalam Rockworks 15.

Nilai resistivitas batuan menurut Vozoff (1991) ditunjukkan pada **Tabel 1** dan menurut Telford dkk. (1990) **Tabel 2**. Daerah penelitian memiliki komposisi geologi batuan gamping dari Formasi Wonosari dan breksi Formasi Nglanggran. Perbedaan nilai resistivitas antar komposisi geologi tersebut akan mampu menunjukkan kelimpahannya dan kontak antara lapisan di bawah permukaan sehingga bidang gelincir dapat diinterpretasikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil inversi 1D pada titik 1x menunjukkan error sebesar 0,19 dengan rata-rata peredaman (damp-mean) 0,17. Lapisan pertama memiliki resistivitas seharga 197,93 Ωm dengan ketebalan 31, 21 m di bawah permukaan. Lapisan kedua dengan resistivitas 229,19 Ωm ketebalannya mencapai 154,86 m di bawah permukaan. Inversi pada titik 2x memiki nilai RMS-error 0,11 dan rata-rata peredaman 0,14. Hasil inversi titik ini memiliki nilai resistivitas perlapisan yang mirip dengan titik ukur 1x. Jarak antara titik ukur 1 dan 2 sekitar 750 m. Hasil inversi lapisan pertama menunjukkan nilai resistivitas 66,23 Ωm setebal 89,21 m dan lapisan kedua 82,15 Ωm setebal 94,96 m, selanjutkan lapisan ketiga menerus hingga kedalaman 1000 m memiliki resistivitas 301,11 Ωm. Titik 3x memiliki error 0,19 dengan ratarata redam 0,1. Lapisan pertama dengan resistivitas 69,14 Ωm dan ketebalan 121,07 m. Lapisan kedua memiliki resistivitas 84,15 Ωm setebal 141,16 m lalu lapisan ketiga memiliki resistivitas 298,31 diinterpretasikan menerus hingga kedalaman 1000 m. Selanjutnya titik 4x memiliki kedalaman 12,11 m untuk resistivitas lapisan pertama dengan angka kecil yaitu 9,04 Ω m melonjak ke lapisan kedua mencapai nilai 248,05 Ωm hingga kedalaman 179,16 m di bawah permukaan, kemudian lapisan ketiga dengan resistivitas 298,21 Ωm menerus hingga kedalaman 1000 m. RMS-error pada titik 3x yaitu 0,21 dan rata-rata peredaman senilai 0,1. Hasil inversi 1D perlapisan untuk titik 5x lapisan pertama hingga tiga berturut memiliki resistivitas 191,14 Ωm; 257,05 Ωm dan 301, 27 Ωm. Pola resistivitas pada titik ini memiliki kemiripan dengan titik 1 dan titik 8. Ketebalan lapisan pertama 52,65 m dan lapisan kedua 129,15 m dan lapisan ke tiga menerus hingga kedalaman 1000 m. Selanjutnya untuk titik 6x pola ketiga lapisan hasil inversi memiliki kemiripan pola resistivitas dengan titik 2 dan titik 9. Sedangkan titik 7 memiliki kemiripan dengan titik 4.

Batuan	Res minimum (ohm-m)	Res maksimum (ohm-m)
Granit	3 x 10 ³	106
Gabro	10 ³	10^{6}
Batu Gamping	50	107
Batu Pasir	1	6,4 x 10 ⁸
Serpih	0,3	$2 \ge 10^3$
Marl	3	70

Tabel 1. Resistivitas b	atuan (Vozoff, 1991)
--------------------------------	----------------------

Tabel 2. Resistivitas batuan (Telford dkk., 1990)

Batuan	Res minimum (ohm-m)	Res maksimum (ohm-m)
Udara	0	0
Batu Pasir	200	$8 \ge 10^3$
Andesit	170	$4,5 \ge 10^4$
Aluvium	10	800
Air Asin	0,2	
Air Tanah	0,5	300

Setelah data hasil inversi 3 lapisan diperoleh, dibuat diagram batang per-titik pengukuran dari kedalaman nol hingga 1000 m, ditampilkan pada **Gambar 4**. Diagram batang disajikan untuk mempermudah membaca data hasil inversi 1D setiap titiknya. Rata-rata ketebalan lapisan pertama dari 9 titik pengukuran adalah 44 m. Kemudian rata-rata ketebalan lapisan kedua mencapai 175 m sedangkan lapisan ketiga dikalkulasi memiliki ketebalan tanpa batas. Nilai resistivitas terendah yaitu 2,04 Ω m dan nilai tertinggi mencapai 311,27 Ω m. Sedangkan rata-rata nilai *error* dari hasil inversi 0,17 dengan rata-rata peredaman dari 9 titik pengukuran senilai 0,3.

Data hasil inversi 1D divisualkan dalam bidang 3D untuk tampilan yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik secara visual. Ke-9 titik ukur AMT di plotkan dalam bidang 3D yang ditampilkan pada **Gambar 5**.



Gambar 4. Diagram batang Visual 1D data AMT 1 – AMT 9 hasil inversi menggunakan MT INV. Menggunakan interpretasi 3 lapisan



Gambar 5 a. Plot titik ukur data AMT dengan data resistivitas hasil inversi 1D b. Visual struktur resistivitas 3D menggunakan software *Rockworks*

Lintasan AA' dan lintasan BB' dibuat menyilang untuk membantu interpretasi bawah permukaan. Kedua lintasan mampu mewakili ke-9 titik pengukuran. Lintasan AA' melewati 3

titik ukur AMT, yaitu AMT 1, AMT 5 dan AMT 9 dengan panjang lintasan mencapai 2240 m. Ketinggian minimum pada lintasan AA' yaitu 44 m dan ketinggian maksimum adalah 130 m di atas permukaan laut. Dengan koordinat UTM antara 425190, 9114900 dan 426800, 9113400.

Sedangkan lintasan BB' melewati titik ukur AMT 7, AMT 5, dan AMT 3 dengan jarak 2240 m. Elevasi maksimum mencapai 260 m di atas permukaan laut dan elevasi minimum 20 m di atas permukaan laut. Lintasan ini terletak pada koordinat UTM antara 425100, 9113400 dan 426830, 9114900.

Paleo-rockslide Parangtritis melibatkan batugamping yang terdapat pada titik

pengukuran AMT 3, AMT 6 dan AMT 9 (Gambar 6). Berdasarkan Husein dkk. (2007) area paleo-rockslide ini menerus ke timur daerah penelitian ini hingga dibatasi sesar Girijati pada sisi timur area paleo-rockslide. Menurut Lutton dkk. (1979) terjadinya rockslide sebagian besar dikendalikan oleh struktur geologi seperti batas perlapisan dan sesar. Maka, berdasarkan bidang data resistivitas penelitian ini bidang gelincir dari paleo-rockslide Parangtritis sisi barat dapat ditafsirkan.



Gambar 6. Visual 3D fence struktur resistivitas dari perpotongan lintasan A-A' dan lintasan B-B'

Kejadian *rockslide* bergerak pada suatu bidang yang disebut bidang gelincir atau bidang geser. Berdasarkan struktur resistivitas dari data AMT, bidang geser dari area *paleo-rockslide* Parangtritis berada pada kedalaman hingga sekitar 250 m di bawah permukaan. Bidang ini merupakan bidang kontak antara batugamping Wonosari dan breksi andesit Nglanggran. Mendukung pernyataan Husein dkk. (2007), bidang gelincir yang tergambar pada lintasan AA' maupun BB' ini melengkung pada *headward* dan *toe-ward* serta memotong bidang perlapisan batugamping. *Head-ward*, menyuplai graben saat sesar normal mendorong massa batuan bergerak ke bawah. *Toe-ward*, menyuplai cekungan saat sesar dorong utara mendorong massa batuan turun. Sehingga menghasilkan tebing-tebing tinggi dari blok dorong. Secara melintang bidang gelincir ini membentuk busur pada sisi graben dan mengontrol pergerakan massa batuan menuju ke tenggara. Ditinjau dari struktur resistivitas data AMT ini, bidang geser ini hanya terjadi pada kontak stratigrafi batugamping Wonosari dan breksi Nglanggran pada kedalaman sekitar 250 m. Melihat fakta bahwa keberadaan struktur geologi regional yang ada di daerah penelitian tidak terbentuk dalam satu kurun waktu, maka analisis karakteristiknya akan menjadi rumit terlebih ini adalah kondisi di bawah permukaan. Kedua penampang resistivitas kemudian di korelasikan secara sederhana hingga dapat diinterpretasikan bahwa terdeteksi adanya kontak batas antar lapisan yang diduga sebagai bidang geser pasif dari longsor purba Parangtritis seperti terlihat pada **Gambar 7**. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Husein dkk. (2007) bahwa bidang gelincir pasif (ikutan dari bidang gelincir aktif yang mengontrol longsor yaitu sesar normal Girijati) dari *paleo-rockslide* Parangtritis merupakan kontak yang membatasi breksi andesit Formasi Nglanggran dengan batugamping Formasi Wonosari. Bidang geser pasif ini juga manjadi batas satuan morfologi Pegunungan Strutural Terbiku Sedang dengan satuan morfologi Pegunungan Struktural Terbiku Kuat yang diklasifikasikan oleh Husein dan Srijono (2007).



Gambar 7. Penampang Resistivitas Lintasan AA' dan BB'. Tmn: Breksi Andesit Nglanggran, Tmw: Batugamping Terumbu Wonosari. Panah hitam: bidang gelincir

Terdapatan *paleo-rockslide* ini dibuktikan terdapatnya morfologi dengan adanya ketinggian mencapai 260 m dan adanya tebing curam. Tentunya dengan morfologi yang signifikan, menjadikan area *paleo-rockslide* ini memiliki nilai resiko longsor masa kini. Seperti dijelaskan oleh Karlina (2014) bahwa, daerah Parangtritis dan sekitarnya memiliki resiko bahaya jatuhan batuan dari rendah hingga tinggi.

5. KESIMPULAN

Hasil inversi 1D data *audio-magnetoteluric* (AMT) dari 9 titik pengukuran menunjukkan nilai *error* terkecil dengan model 3 lapisan. Resistivitas rendah (0-10 Ω m) diinterpretasikan sebagai endapan pantai dan gumuk pasir, resistivitas sedang (50-160 Ω m) untuk

batugamping Wonosari dan Resistivitas tinggi (170-350 Ω m) untuk breksi andesit Nglanggran. Ketebalan rata-rata lapisan pertama 44 m dan lapisan kedua mencapai 175 m.

Berdasarkan struktur resistivitas bawah permukaan di area *paleo-rockslide* Parangtritis kontak batas lapisan antara batugamping Formasi Wonosari dan breksi Formasi Nglanggran pada kedalaman sekitar 250 m dibawah permukaan yang diduga menjadi bidang geser ikutan dari sesar yang mengontrol *paleo-rockslide* Parangtritis di sisi timur daerah penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami dedikasikan kepada Universitas Lampung, Fakultas Teknik

Dan Jurusan Teknik Geofisika. Data pokok kami peroleh berkat bantuan ibu Sintia Windi dari Geofisika Universitas Gadjah Mada. Referensi utama dari bapak Salahudin Husein Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

- Berktold, A. (1983). Electromagnetic studies in geothermal regions. *Geophysical Surveys*. https://doi.org/10.1007/BF01454000
- Cagniard, L. (1953). BASIC THEORY OF THE MAGNETO-TELLURIC METHOD OF GEOPHYSICAL PROSPECTING. *GEOPHYSICS*.

https://doi.org/10.1190/1.1437915

- Caldwell, G., Pearson, C., & Zayadi, H. (1986). Resistivity of Rocks in Geothermal Systems: A Laboratory Study. *Proceedings 8th NZ Geothermal Workshop*.
- Hoover, D. B., & Long, C. L. (1976). Audiomagnetotelluric methods in reconnaissance geothermal exploration.

http://pubs.er.usgs.gov/publication/70043033

- Husein, S., & Srijono. (2007).Tinjauan Geomorfologi Pegunungan Selatan DIY/Jawa Tengah: Telaah Peran Faktor Endogenik dan Eksogenik dalam Proses Pembentukan Pegunungan. Proceeding Workshop: Potensi Pegunungan Selatan dalam geologi Pengembangan Wilayah. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2784.0727
- Husein, S., Sudarno, I., & Nugraha, A. (2007). Megascale Paleo-landslide at Parangtritis, as deduced from Geological and Geophysical Data.

Proceeding of Joint Convention Bali 2007, the 32nd HAGI, the 36th IAGI and the 29th IATMI Annual Convention, November 2007. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2849.6080

- Juliarka, B. (2017). Pemodelan Sistem Panasbumi Parang Wedang, Kabupaten Bantul, Yogyakarta berdasarkan Data Geologi, Geomagnetik dan Geokimia. Universitas Gadjah Mada.
- Karlina, T. (2014). Zonasi Bahaya Jatuhan Batuan di Sepanjang Jalan Desa Parangtritis - Desa Giricahyo, Provinsi DIY. Universitas Gadjah Mada.
- Lutton, R. J., Banks, D. C., & Strohm, W. E. (1979). Slides in Gaillard Cut, Panama Canal Zone. In Developments in Geotechnical Engineering. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-41508-0.50012-0
- Rahardjo, W., Sukandarrumidi, & Rosidi, H. M. D. (1995). Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa (2 ed.). Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics. 2nd edition. Cambridge University Press.
- Varnes, D. (1978). SLOPE MOVEMENT TYPES AND PROCESSES. Transportation Research Board Special Report.
- Vozoff, K. (1991). 8. The Magnetotelluric Method. In *Electromagnetic Methods in Applied Geophysics* (hal. 641–712). Society of Exploration Geophysicists.

https://doi.org/10.1190/1.9781560802686.ch8