
PAPER NAME	AUTHOR
Substitusi Tepung Onggok Terfermentasi Dalam Pembuatan Crackers	Siti Nurdjanah

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
4030 Words	24567 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
8 Pages	354.9KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jul 26, 2022 9:58 PM GMT+7	Jul 26, 2022 10:02 PM GMT+7

● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Bibliographic material

Substitusi Tepung Onggok Terfermentasi Dalam Pembuatan Crackers

Substitution of Fermented Cassava Baggase Flour In Cracker Processing

Otik Nawansih¹⁾, Azhari Rangga¹⁾, Siti Nurdjanah¹⁾, dan Anggy Putri Ernani²⁾

¹⁾Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung

¹⁾Alumni Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung

e-mail : otiknawansih@yahoo.co.id

Abstrak

Tepung onggok terfermentasi mengandung pati 46,69%, serat pangan 13,49% dan protein 6,98%, mempunyai potensi untuk substitusi tepung terigu pada pembuatan crackers. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan substitusi tepung onggok terfermentasi yang menghasilkan sifat sensori crackers yang masih baik sesuai dengan Standar Mutu Biskuit SNI 2973-2011. Tepung onggok terfermentasi disubsitusikan menggantikan tepung terigu sebesar 0% (b/b); 5% (b/b); 10% (b/b); 15% (b/b); 20% (b/b) dan 25% (b/b). Adonan sesuai resep crackers kemudian dicetak dan dioven. Crackers yang dihasilkan diamati tekstur menggunakan uji scoring sedangkan rasa, aroma, warna dan penerimaan keseluruhan menggunakan uji hedonik. Data dianalisis dengan ANARA dan dilanjutkan dengan uji Orthogonal Contrast (OC) taraf 5%. Perlakuan terbaik kemudian uji proksimat serta dilakukan uji banding dengan crackers yang menggunakan onggok dari industri tapioka yang difermentasi untuk melihat prospek aplikasinya dalam skala industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok terfermentasi 5% (b/b) memiliki karakteristik sensori yang masih diterima/disukai yaitu tekstur 3,89 (renyah), rasa 3,59 (suka), warna 3,76 (suka), aroma 3,52 (suka) dan penerimaan keseluruhan 3,66 (suka) serta mengandung kadar air 1,97%, kadar abu 1,98%, kadar protein 7,28%, kadar lemak 15,23%, karbohidrat 73,54 dan total serat pangan 7,30%. Kelebihan dari crackers ini adalah kandungan seratnya yang tinggi. Crackers ini mempunyai peluang tinggi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan onggok dari industri tapioka yang difermentasi karena hasil uji Crcakers yang dihasilkan memiliki karakteristik yang sama dengan yang disubstitusi dari onggok fermentasi yang dibuat skala laboratorium.

Kata kunci: Crackers, sifat sensori, substitusi, Tepung onggok terfermentasi

Abstract

Solid residue form tapioca industry (baggage) has not been fully utilized as food source. The aim of this research was to substitute wheat flour with fermented cassava baggage flour to produce crackers having good sensory properties, and in accordance with the Quality Standard of Biscuit SNI 2973-2011. The experiment was arranged in a Complete Randomized Block Design (CRBD) with 4 replications. The treatment consisted of 6 levels of fermented cassava baggage flour substitution which were 0% (w/w); 5% (w/w); 10% (w/w); 15% (w/w); 20% (w/w) and 25% (w/w). The crackers's dough was formed and baked, then sensory test was conducted for texture, flavor, color, aroma and overall acceptance. The data were analysed by ANOVA and then continued tested using Contrast Orthogonal test. The results showed that the crackers with the substitution 5% of fermented cassava baggage flour had the best treatment. This crackesrs had texture score of 3.89 (crispy), flavor of 3.59 (like), color of 3.76 (like), aroma of 3 ,52 (like), overall acceptance of 3,66 (like) and contained 1.97% of moisture, 1.98% of ash, 7.28% of protein, 15.23% of fat, 73.54 of carbohydrates and total dietary fiber of 7,30%. Crackers with the best treatment applied on fermented baggage flour from tapioca industry had the same sensory properties as crackers with substitution of fermented laboratory prepared baggage flour.

Keywords: Crackers, Fermented bagasse cassava flour, Sensory properties

Pendahuluan

Menurut BPS (2016), produksi singkong Indonesia Tahun 2015 sebesar 21.790.956 ton

dan Provinsi Lampung menyumbang produksi sebesar 7.387.084 ton (33,9%). Industri olahan singkong yang berkembang adalah industri tapioka. Onggok merupakan limbah padat

industri tapioka dengan persentasi sekitar 60% dari bahan baku singkong (FAO, 2001).

Onggok mengandung pektin 10,11%, hemiselulosa 21,8% dan selulosa 6,31% (Nurdjanah dan Elfira, 2009). Komponen tersebut merupakan komponen polisakarida non pati, dimana dinding sel nya merupakan komponen terbesar dalam pembentukan *dietary fiber* (Schmidl dan Labuza, 2000). Salah satu kendala pemanfaatan onggok untuk bahan pangan adalah masih adanya kandungan sianida yang cukup tinggi karena penggunaan singkong pahit sebagai bahan baku industri tapioka.

Menurut Olaoye *et al.* (2015), salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kandungan sianida adalah dengan proses fermentasi seperti yang terjadi dalam pengolahan *Garri*. Proses fermentasi menggunakan *Saccharomyces cerevisiae* juga mampu menurunkan kandungan sianida pada onggok sebagai bahan pakan ternak (Kaewongso *et al.*, 2011; Aizah *et al.*, 2017). Menurut Hidayat *et al.* (2018), proses fermentasi onggok selama 4 hari dengan *S.cerevisiae* sebanyak 2% (b/b) akan meningkatkan kandungan protein onggok dari 0,92% menjadi 6,98% dan menurunkan kandungan HCN onggok dari 30,52 ppm menjadi 8,87 ppm.

Tepung onggok terfermentasi yang kaya serat dapat digunakan sebagai bahan baku crackers. Menurut Standar Mutu Biskuit SNI 2973-2011, crackers adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan yang melalui proses fermentasi atau pemeraman, berbentuk pipih dan rasanya lebih mengarah ke rasa asin dan renyah serta bila dipatahkan penampang potongannya berlapis-lapis.

Crackers biasanya berbahan baku tepung terigu, namun berbagai upaya substitusi telah dilakukan dengan tepung gayam (Jariyah *et al.*, 2013), tepung kedelai (Sulistyowati *et al.*, 2015), dan tepung suweg (Khatarina, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi. Menurut Hidayat *et al.*, (2018), onggok terfermentasi mengandung pati 46,69%, serat pangan 13,49% dan protein 6,98% sehingga bila disubstitusikan dalam pembuatan crackers diharapkan dapat menghasilkan crackers kaya serat. Permasalahan yang ada yaitu belum ditemukan substitusi yang tepat untuk menghasilkan crackers yang masih disukai dan sesuai dengan

Standar Mutu Biskuit SNI 2973:2011. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung onggok fermentasi terhadap sifat sensori dalam pembuatan crackers.

Bebberapa percobaan telah dilakukan untuk substitusi tepung terigu dengan tepung gayam (Jariyah *et al.*, 2013), tepung kedelai (Sulistyowati *et al.*, 2015) dan tepung suweg (Khatarina, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil substitusi dengan tepung umbi suweg terbaik adalah 10%, demikian juga tepung kedelai dan tepung teri sebesar 10%. Oleh karena itu substitusi tepung onggok terfermentasi hasil penelitian Hidayat *et al.* (2018) juga mempunyai potensi untuk diaplikasikan dalam pembuatan crackers. Tepung onggok hasil fermentasi dengan *Sacharomyces cerevisiae* 2% (b/b) selama 4 hari menghasilkan karakteristik tepung dengan derajat putih 52,70%, kandungan pati 46,69%, serat pangan 13,49%, lemak 0,59%, protein 6,98% dan kadar HCN 8,87 ppm.

Namun demikian penggunaan tepung onggok fermentasi untuk substitusi tepung terigu dalam pembuatan crackers harus tetap menghasilkan crackers yang masih disukai. Substitusi yang terlalu banyak diduga akan menghasilkan tekstur yang keras akibat kurangnya gluten dan gliadin yang mampu menahan gas sehingga adonan kurang mengembang. Selain tekstur, rasa, aroma dan warna juga akan dipengaruhi oleh substitusi tepung terkait. Hasil penelitian Jariyah *et al.* (2013) menunjukkan semakin banyak tepung gayam yang disubstitusikan menghasilkan warna crackers yang semakin coklat dan tidak disukai. Demikian juga hasil penelitian Khatarina (2018) menunjukkan bahwa semakin banyak tepung suweg yang disubstitusikan menghasilkan rasa dan aroma crackers yang langit dan tidak disukai panelis. Oleh karena itu perlu dicari konsentrasi maksimal tepung onggok fermentasi yang menghasilkan crackers dengan karakteristik sensori yang masih disukai.

Metode Penelitian

Bahan yang digunakan adalah Singkong varietas Kasetser dengan umur panen 9 bulan diperoleh dari Petani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, onggok basah dari industri tepung tapioka PD. Semangat Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Fermipan (inoculum komersial *Sacharomyces cerevisiae*), tepung terigu merk Kunci Biru, gula halus merk Ratu, garam, margarin merk Blue Band, susu skim merk Tropicana Slim ⁷ air dan *baking powder* merk Koepoe-koepoe. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah aquades, heksane, H_2SO_4 , HCl, $CuSO_4 \cdot 5H_2O_2$, K_2SO_4 , α amilase, amyloglukosidase, H_3BO_4 , buffer fosfat, etanol, aseton dan indikator PP. Alat utama yang digunakan dalam penelitian adalah *blender*, *slicer*, centong, wadah *mixer*, oven listrik, timbangan, roll penggiling, desikator, neraca analitik, tanur, alat ekstraksi Soxhlet dan reflux.

Percobaan ¹⁰ disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 4 ulangan. Perlakuan berupa faktor tunggal yaitu substitusi tepung terigu dengan tepung onggok fermentasi sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25% (b/b). Homogenitas diuji dengan uji *Barlett* dan kemenambahan data diuji dengan uji *Tuckey*. Data dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapat pendugaan ragam galat dan uji signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan uji Orthogonal Contrast (OC) pada taraf 5%..

Pembuatan tepung onggok terfermentasi (Hidayat *et al.*, 2018)

Pembuatan tepung onggok terfermentasi diawali dengan memperoleh onggok basah yang meliputi proses sortasi dengan memilih singkong segar dan umbi sudah memasuki umur panen 9 bulan, pembersihan (pengupasan dan pencucian), pengecilan ukuran (pemotongan dan penghalusan) dan ekstraksi. Kemudian onggok difermentasi dengan menambahkan 2% (b/b) dari *S.cerevisiae* selama 4 hari dengan suasana fakultatif anaerob. Selanjutnya onggok fermentasi dikeringkan pada suhu 50°C hingga kadar airnya ±10%, kemudian digiling dan diayak dengan ukuran 80 mesh.

Pembuatan Crackers

Satu satuan percobaan berbasis 100 g tepung. Margarin 24g, garam 1 g, gula 2g, susu

skim 10g dan air 50 ml diaduk sampai rata. Selanjutnya dilakukan pencampuran tahap 1(tepung terigu dan ragi), pencampuran tahap 2 (tepung onggok terfermentasi dan *baking powder*) sesuai perlakuan sampai kalis, difermentasi selama 60 menit pada suhu ruang, pembentukan lembaran dengan ketebalan 2 cm, penambahan bahan pengisi berupa tepung terigu, pencetakan dengan ukuran seragam, pembentukan lubang sebanyak ±10 lubang dan dioven pada suhu 190°C selama 20 menit.

Pengamatan

Tepung onggok terfermentasi dan tanpa fermentasi diamati kadar HCN menggunakan metode titrasi dengan $AgNO_3$ (SNI 7622, 2011). Sedangkan *crackers* diamati sifat sensori yaitu tekstur dengan metode skoring, kemudian rasa, aroma, warna dan penerimaan keseluruhan dengan metode hedonik (Nurainy dan Nawansih, 2006). Perlakuan terbaik dianalisis ⁷ sifat kimia meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak dan protein (SNI 01-2891, 1992), karbohidrat dengan metode *by different* (Andarwulan, dkk, 2011) dan total serat pangan (AOAC 991.43, 1995) dan dibandingkan dengan Standar Mutu Biskuit SNI 2973-2011. Selain itu *crackers* perlakuan terbaik diterapkan pada onggok industri terfermentasi untuk melihat peluang pemanfaatan onggok industri. Crackers dengan kedua jenis bahan ini karakteristik sensorinya diuji dengan Uji Pasangan Tunggal dengan respon berarah menggunakan panel semi terlatih sebanyak 20 orang.

Hasil Dan Pembahasan

Kadar HCN Tepung Onggok Terfermentasi


Tepung onggok fermentasi mengandung HCN lebih rendah (9,8 ppm) dibandingkan tepung onggok tanpa fermentasi (21,57 ppm) atau fermentasi mampu menurunkan 54,57% HCN. Kadar sianida pada tepung onggok terfermentasi sebesar 9,8 ppm masih memenuhi ambang batas kadar HCN sebesar 10 ppm untuk bahan baku yang digunakan untuk pembuatan produk pangan (FAO, 1989).

Sifat Sensori crackers

Tekstur

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kerenyahan *crackers* yang dihasilkan. Hasil uji lanjut orthogonal contrast menunjukkan bahwa substitusi tepung onggok terfermentasi dapat menurunkan kerenyahan *crackers* yang dihasilkan (Gambar ³

1). Penambahan tepung onggok terfermentasi diduga menyebabkan penurunan total gluten pada adonan yang memberikan dampak terhadap penurunan sifat elastisitas adonan sehingga crackers kurang mengembang dan menjadi keras. Menurut Subandoro *et al.* (2013), jika jumlah gluten pada adonan sedikit menyebabkan adonan kurang mampu menahan gas, sehingga pori-pori adonan yang terbentuk berukuran kecil-kecil dan kemampuan untuk mengembang menjadi tidak sempurna.



Gambar 1. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap tekstur crackers

Keterangan:


1 = Sangat tidak renyah; 2 = Tidak renyah; 3 = Agak renyah; 4 = Renyah; 5 = Sangat renyah

Substitusi tepung onggok fermentasi : A1 (0%); A2 (5%); A3(10%); A4(15%); A5(20%); A6(25%)

Rasa

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi berpengaruh sangat nyata pada skor kesukaan terhadap rasa. Hasil uji lanjut orthogonal contrast menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok terfermentasi 5% (b/b) dan 10% (b/b) memiliki rasa sama dengan crackers tanpa substitusi tepung onggok terfermentasi A1 (0%) dengan skor 3,61 (disukai). Substitusi tepung onggok lebih dari 10% menghasilkan rasa crackers yang kurang disukai. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pembentukan senyawa-senyawa hasil metabolisme berupa perombakan karbohidrat menjadi glukosa dan terjadinya peningkatan kadar alkohol serta meningkatnya total asam (Suliantri dan Winiarti, 1991 dalam Fahmi dan Nurrahman, 2011). Pengaruh lain yang menyebabkan terbentuknya rasa asam karena pH tepung

onggok terfermentasi tergolong asam (5,64) sehingga mempengaruhi rasa yang dihasilkan.



Gambar 2. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap rasa crackers


Keterangan:

1 = Sangat tidak suka; 2 = Tidak suka; 3 = Agak suka; 4 = Sulit; 5 = Sangat suka
Substitusi tepung onggok, A1=0%; A2=5%; A3=10%; A4=15%; A5=20%; A6=25%

Aroma

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap skor kesukaan aroma crackers yang dihasilkan. Hasil uji lanjut orthogonal contrast, menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok terfermentasi 5% (b/b) memiliki aroma crackers sama dengan crackers tanpa substitusi tepung onggok terfermentasi yaitu disukai.

Aroma yang terbentuk pada crackers hasil penelitian ini diduga merupakan kombinasi dari tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi serta bahan lain seperti margarin. Semakin banyak persentase tepung onggok terfermentasi yang disubstitusikan maka aroma crackers cenderung tidak disukai. Aroma asam yang dihasilkan diduga karena pH tepung onggok terfermentasi tergolong asam yaitu sebesar 5,64 sesuai dengan hasil penelitian Hadi (2017), dimana fermentasi pati singkong dengan *S.cerevisiae* menghasilkan penurunan pH menjadi 5,6. Sedangkan aroma harum khas crackers disebabkan oleh penambahan margarin. Menurut Okaviana *et al.* (2017), penambahan margarin mampu menutupi aroma pada tepung mocaf dan tepung pisang kepop pada pembuatan cookies. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap aroma crackers disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3.1 Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap aroma crackers

Keterangan:

1 = Sangat tidak suka; 2 = Tidak suka; 3 = Agak suka; 4 = Suka; 5 = Sangat suka
Substitusi tepung onggok, A1=5%; A2=10%; A3=15%; A4=20%; A5=25%

Warna

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kesukaan warna crackers yang dihasilkan. Hasil uji lanjut orthogonal contrast menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok terfermentasi 5-10% memiliki warna sama dengan crackers tanpa substitusi onggok terfermentasi (A1, 0%) yaitu disukai.



Gambar 4.1 Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap warna crackers

Keterangan:


1 = Sangat tidak suka; 2 = Tidak suka; 3 = Agak suka; 4 = Suka; 5 = Sangat suka
Substitusi tepung onggok, A1=0%; A2=5%; A3=10%; A4=15%; A5=20%; A6=25%

Penambahan tepung onggok terfermentasi menyebabkan penurunan skor

kesukaan terhadap warna crackers yang berwarna kecoklatan. Hal tersebut dikarenakan tepung onggok terfermentasi memiliki warna putih kecoklatan sehingga berpengaruh terhadap warna crackers. Selain itu warna kecoklatan pada crackers disebabkan oleh reaksi Mailard (Akbar dan Yunianta (2014) yang terjadi pada proses pemanggangan sehingga warna umum crackers adalah kuning kecoklatan. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap aroma crackers disajikan pada Gambar 4.

Penerimaan Keseluruhan

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi berpengaruh nyata terhadap skor penerimaan keseluruhan. Hasil uji lanjut ortogonal contrast menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok terfermentasi 5% (b/b) dapat dikatakan memiliki skor penerimaan keseluruhan yang sama dengan crackers tanpa substitusi tepung onggok terfermentasi yang memiliki skor tertinggi.



Gambar 5.1 Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap penerimaan keseluruhan crackers

Keterangan:

1 = Sangat tidak suka; 2 = Tidak suka; 3 = Agak suka; 4 = Suka; 5 = Sangat suka
Substitusi tepung onggok, A1=0%; A2=5%; A3=10%; A4=15%; A5=20%; A6=25%

Penurunan skor kesukaan panelis terhadap penerimaan keseluruhan crackers yang disubstitusikan dengan tepung onggok terfermentasi mulai dari 5% disebabkan oleh respon panelis terhadap rasa, aroma, warna dan tekstur crackers. Menurut Wonggo (2010) suatu bahan pangan yang memiliki tekstur yang baik dan rasa yang enak akan dikonsumsi jika

memiliki warna tidak menyimpang seperti warna aslinya begitu juga sebaliknya. Pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terhadap penerimaan keseluruhan *crackers* disajikan pada Gambar 5.

Penentuan Perlakuan Terbaik

Penentuan perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi terbaik berdasarkan pada hasil pengamatan uji sensori terhadap *crackers* yang dihasilkan meliputi parameter warna, rasa, aroma, tekstur dan penerimaan keseluruhan. Penentuan perlakuan terbaik *crackers* substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penentuan perlakuan terbaik sifat sensori *crackers* substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi

Parameter	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Tekstur	4,15	3,89*	3,74**	3,58**	3,45**	3,08**
Aroma	3,58	3,52 ^{tn}	3,41*	3,32**	3,30**	3,22**
Rasa	3,61	3,59 ^{tn}	3,57 ^{tn}	3,37**	3,29**	3,24**
Warna	3,96	3,76*	3,56**	3,27**	3,11**	2,96**
Penerimaan keseluruhan	3,78	3,66 ^{tn}	3,57**	3,42**	3,32**	3,27**

Keterangan :

* = Berbeda nyata pada uji lanjut orthogonal contrast taraf 5%

** = Berbeda nyata pada uji lanjut orthogonal contrast taraf 10%

tn = tidak berbeda nyata

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung terigu dengan tepung onggok terfermentasi 5% (A2) menghasilkan crackers dengan aroma, rasa dan penerimaan keseluruhan tidak berbeda dengan crackers tanpa substitusi tepung onggok terfermentasi (A1), kecuali parameter tekstur dan warna berbeda.

Analisis Kimia Perlakuan Terbaik

Komposisi kimia *crackers* yang disubstitusi tepung onggok terfermentasi 5% dan SNI disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi kimia *crackers* yang disubstitusi tepung onggok terfermentasi 5%

Komponen	Crackers substitusi tepung onggok terfermentasi	SNI Biskuit 2973-2011	Keterangan
Kadar Air	1,97 %	Maks.5%	Memenuhi
Kadar Abu	1,98%	-	Memenuhi
Kadar Protein	7,28%	Min.5%	Memenuhi
Kadar Lemak	15,23%	-	Dapat diterima
Kadar Karbohidrat	73,54%	-	Dapat diterima
Total Serat Pangan	7,30%	-	Dapat diterima

Hasil analisis kimia pada Tabel 3. menunjukkan bahwa crackers dengan substitusi tepung onggok fermentasi 5% dapat diterima dan sesuai dengan Standar Mutu Biskuit SNI 2973-2011 pada kadar air dan kadar protein sedangkan untuk parameter lain tidak dipersyaratkan.


Percobaan Lanjutan

Crackers yang dihasilkan dari perlakuan substitusi tepung onggok terfermentasi sebesar 5% (b/b), diaplikasikan pada onggok industri dan difermentasi dengan cara yang sama. Kedua crackers tersebut karakteristiknya ¹⁸ diuji dengan uji pasangan. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji pasangan *crackers* yang disubstitusi tepung onggok penelitian terfermentasi perlakuan 5% dan *crackers* yang disubstitusi tepung onggok industri terfermentasi 5%.

Parameter	Respon	
	Berbeda	Sama
Tekstur	4	16
Warna	4	16
Aroma	3	17
Rasa	5	15

Hasil uji pasangan tersebut menunjukkan bahwa tekstur, warna, aroma dan rasa *cracker* yang disubstitusi tepung onggok industry terfermentasi 5% tidak berbeda dengan *cracker* yang disubstitusi onggok penelitian 5% (≥ 15 panelis mengatakan sama). Penampakan dari *crackers* tepung onggok terfermentasi berbahan onggok penelitian dan onggok industri tepung tapioka disajikan pada Gambar 6. Hal ini menggambarkan bahwa onggok industri punya potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan substitusi tepung terigu pada pembuatan crackers.



Gambar 6. *Crackers* yang disubstitusi tepung onggok terfermentasi buatan sendiri (a) dan onggok industri tepung tapioka PD. Semangat Jaya Pesawaran terfermentasi (b)

Hal tersebut diduga karena kedua tepung onggok fermentasi mempunyai karakteristik yang hamper sama, ditunjukkan dengan nilai pH kedua tepung mendekati kesamaan yaitu 5,64 dan 5,70. Selain itu warna kedua tepung onggok terfermentasi memiliki warna putih abu-abu kecoklatan (Gambar 7).



Gambar 7. Tepung onggok penelitian terfermentasi(a) dan tepung onggok industri terfermentasi

Crackers dengan substitusi tepung onggok penelitian terfermentasi 5% mempunyai karakteristik tekstur renyah (3,89), aroma disukai (3,52), rasa disukai (3,59), warna disukai (3,76), penerimaan keseluruhan disukai (3,66), kadar air 1,97 %, kadar abu 1,98%, kadar protein 7,28 %, kadar lemak 15,23%, kadar karbohidrat 73,54% dan total serat pangan 7,30%. Hasil uji pasangan *crackers* dengan substitusi tepung onggok industri terfermentasi 5% memiliki karakteristik tekstur, aroma, rasa dan warna yang sama dengan *crackers* substitusi tepung onggok penelitian terfermentasi 5%.

Kesimpulan

Crackers dengan substitusi tepung onggok penelitian terfermentasi 5% mempunyai karakteristik tekstur renyah (3,89), aroma disukai (3,52), rasa disukai (3,59), warna disukai (3,76), penerimaan keseluruhan disukai (3,66), kadar air 1,97 %, kadar abu 1,98%, kadar protein 7,28 %, kadar lemak 15,23%, kadar karbohidrat 73,54% dan total serat pangan 7,30%. Hasil uji pasangan *crackers* dengan substitusi tepung onggok industri terfermentasi 5% memiliki karakteristik tekstur, aroma, rasa dan warna yang sama dengan *crackers* substitusi tepung onggok penelitian terfermentasi 5%.

Daftar Pustaka

Afianti, F. dan Indrayani,V. Afianti, F. dan Indrayani,V. 2015. Pengaruh Penambahan Tepung Ikan Gabus

(*Ophiocephalus striatus*) dan Air terhadap Sifat Organoleptik *Crackers*. *Jurnal Boga* 4(1):46-55

Akbar, M.R., dan Yunianta. (2014). Pengaruh Lama Perendaman Na₂S₂O₅ dan Fermentasi Ragi Tape terhadap Sifat Fisik Kimia Tepung Jagung. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 2(2): 91-102

Andarwulan, N. (2011). *Garam dan Gula dalam Adonan Roti*. Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Bogor

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). (1995). *Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists*. Chemist Inc. New York.

Badan Standar Nasional (BSN). (1992). *SNI 01-2891-1992. Cara Uji Makanan dan Minuman*. BSN. Jakarta.

Badan Standar Nasional (BSN). (2011). *SNI 2973-2011. Biskuit*. BSN. Jakarta.

Badan Standar Nasional (BSN). (2011). *SNI 7622-2011. Tepung Mokaf*. BSN. Jakarta.

BPS. (2016). *Data produksi ubi kayu Indonesia*. http://bps.go.id/_linkTableDinamis/view/id/880. Diakses tanggal 14 Agustus 2018

Fahmi, N dan Nurrahman. (2011). Kadar Glukosa, Alkohol dan Citarasa Tape Onggok Berdasarkan Lama Fermentasi. *Jurnal Pangan dan Gizi Vol. 02 No.03*: 25-41

FAO. (2001). *Impact of Cassava Processing on the Environment, in Strategic environmental assessment, FAO Corporate Document Repository*. <http://www.fao.org/>, diakses tanggal 15 Agustus 2018

Hadi, D.T. (2017). Analisis Sifat Kimia dan Fungsional Pasta Pati Singkong Termodifikasi dengan Fermentasi *Saccharomyces cerevisiae*. (Skripsi). Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/29564/>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Hidayat, B., Hasanudin, U., Nurdjanah, S. dan Yuliana, N. (2018). Improvement of Cassava Bagasse Flour Characteristics to Increase Their Potential Use as Food. *IOP Conference Series: Earth and*

- Environmental Science 209 (012006).*
doi:10.1088/1755-1315/209/1/012006
- Izah, S. C., Bassey, S. E. and Ohimain, E. I. (2017). Cyanide and Macro-Nutrients Content of *Saccharomyces cerevisiae* Biomass Cultured in Cassava Mill Effluents. *International Journal of Microbiology and Biotechnology*, 2(4):176-180.
- Jariyah, T., Mulyani dan Setya, P.P. (2013). Kajian Nutrisi Crackers Tepung Gayam. *Jurnal Rekapangan* 7(1):76-90
- Kaewwongsa, W., Traiyakun , S., Yuangklang, C., Wachirapakorn , C., and Paengkoum, P. (2011). Protein Enrichment of Cassava Pulp Fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 10 (18):2434-2440
- Khatarina, S. (2018). *Kajian Substitusi Tepung Umbi Suweg (Amorphophallus campanulatus B) pada Pembuatan Crackers terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik*. Unpublished Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Lampung.
- Nurainy, F dan Nawansih, O. (2006). *Buku Ajar Uji Sensori*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Nurdjanah,S dan Elfira, W. (2009). Profil, Komposisi dan Sifat Fungsional Serat Pangan dari Ampas Ekstraksi Pati Beberapa Jenis Umbi. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian* 14(1):12-22.
- Okaviana, A.S. Hersoelistyorini, W dan Nurhidajah. (2017). Kadar Protein, Daya Kembang dan Organoleptik Cookies dengan Substitusi Tepung Mocaf dan Tepung Pisang Kepok. *Jurnal Pangan dan Gizi* 7 (2): 72-81.
- Olaoye, O.A., Lawrence, I.G., Cornelius, G.N. and Ihenetu , M.E. (2015). Evaluation of Quality Attributes of Cassava Product (Gari) Produced At Varying Length of Fermentation. *American Journal of Agricultural Science*, 2(1) 1-7.
- Schmidl, K.M., dan Labuza, P.P. (2000). *Essential of Functional Foods*. Aspen Publisher, Inc. Gaithersburk. Maryland.
- Subandoro, R.H., Basito dan Atmaka, W. (2013). Pemanfaatan Tepung Millet Kuning Sebagai Substitusi Tepung Terigu dalam Pembuatan Cookies Terhadap Karakteristik Organoleptik dan Fisikokimia. *Jurnal Teknosains Pangan* 2(4).
- Suliantri dan Winiarti. (1991). *Teknologi Fermentasi Biji-bijian dan Umbi-umbian*. Departemen P dan K Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Universitas Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
- Sulistyowati, E., Wijaningsih, W. dan Mintarsih, S.N. (2015). Pengaruh Substitusi Tepung Kedelai dan Tepung Ikan Teri terhadap Kadar Protein dan Kalsium Crackers. *Jurnal Riset Kesehatan* 4 (3):813-818.
- Wonggo, D. 2010 . Penerimaan Konsumen Terhadap Selai Rumput Laut (*Kappaphycus alvarezii*) . *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 6(1): 51-53

● 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Cindi Putri Utami, Betty Yosephin Simanjuntak, Arie Krisnasary. "Analis..."	3%
	Crossref	
2	Nanti Musita. "PEMBUATAN BIOETANOL DARI AMPAS TAHU DENGAN..."	2%
	Crossref	
3	Melkhianus Hendrik Pentury. "Pengaruh Formulasi Tepung Mangrove (..."	2%
	Crossref	
4	Titi Mutiara Kiranawati, Ummi Rohajatien, Rahma Safira Jayanti. "EFFE..."	1%
	Crossref	
5	Eman Darmawan. "PEMANFAATAN BIJI KETAPANG (Terminalia catap..."	<1%
	Crossref	
6	Intan Kusumaningrum Kusumaningrum. "FORMULASI CRISPY COOKIE..."	<1%
	Crossref	
7	Nursafa Nursafa, Erna Rusliana Muhamad Saleh, Mustamin A. Masuku....	<1%
	Crossref	
8	Mariatul Kiptiah, Nina Hairiyah, Ayu NurmalaSari. "Pengaruh Substitusi ..."	<1%
	Crossref	
9	Dian Wulandari, Tirza Hanum, Azhari Rangga. "EFEK KOPIGMENTASI D..."	<1%
	Crossref	

- 10 Fibra Nurainy, Otik Nawansih, Merry Monika Sitanggang. "PENGARUH ... <1%
Crossref
- 11 Helen C.D. Tuhumury, La Ega, Nuram Keliobas. "Pengaruh Substitusi T... <1%
Crossref
- 12 Kyung-Jun Hwang, Nam-Geon Park, Hyung-Soo Park, Chong-Eon Lee, ... <1%
Crossref
- 13 Tutik Apriyanti, Shanti Fitriani, Rahmayuni. "Pemanfaatan Pasta Labu ... <1%
Crossref
- 14 Nadian Ernaningtyas, Sri Budi Wahjuningsih, Sri Haryati. "Substitusi Wo... <1%
Crossref
- 15 Yanuar Muhammad Nur, Efri Efri, Radix Suharjo. "EFEKTIFITAS EKSTR... <1%
Crossref
- 16 Yılmaz, Özlem. "Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Tohumunun süperkriti... <1%
Publication
- 17 N. M. Bobkova, S. E. Barantseva, O. S. Zalygina. "Composite wear-resis... <1%
Crossref
- 18 Noli Novidahlia, Lia Amalia, Brida Januarisca. "FORMULATION CRACK... <1%
Crossref
- 19 Parluhutan Siahaan, Jusak Wongkar, Susan Wowiling, Rowland Mangai... <1%
Crossref
- 20 Sahel Renegade Saragih, Dermiyati Dermiyati, Ainin Niswati, Irwan Suk... <1%
Crossref
- 21 Vita N Lawalata, Penuel Paulus Kdise, Gilian Tetelepta. "Kajian Sifat Ki... <1%
Crossref

- 22 Dewi Fatimatuzzahroh, Bambang Kunarto, Ery Pratiwi. "Lama Ekstraksi... <1%
Crossref
-
- 23 Kigho Moses Oghenejoboh, Henry Oghenero Orugba, Ufuoma Modupe ... <1%
Crossref
-
- 24 Suriany Suriany, Wanti Dewayani, Idaryani Idaryani, Reswita Reswita, F... <1%
Crossref
-
- 25 Rosa Hadiana Putri, Anak agung Sagung Putri Chandradewi, Reni Sofiy... <1%
Crossref
-
- 26 Tri Kusuma Agung, Ima Karimah, Yona Yunita Alviona. "PENGARUH SU... <1%
Crossref