

Compose

- bungdarw... 775
- darwinpan... 999+
- Inbox 775
- Unread
- Starred
- Drafts 70
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- Less
- Views Show

Back [Navigation icons]

list of response JAI Yahoo/JURNAL...

Jurnal Agronomi <jurnal.agronomi> To: bungdarwin@yahoo.com Fri, Jan 27, 2012 at 11:27 AM

Yth. Bapak Darwin H. Pamgaribuan

Kami telah melakukan beberapa koreksi pada naskah Bapak. Kami harap Bapak dapat memperbaiki dan memberi penjelasan pada beberapa komentar dalam naskah tersebut. Dalam file pdf yang kami kirimkan:

1. Tulisan berwarna merah merupakan catatan dari Editor dan diperbaiki atau diberi penjelasan.
2. Tulisan berwarna biru adalah pustaka yang sudah kami konfirmasi kebenarannya.

Kami mohon Bapak dapat menyampaikan penjelasan atau perbaikan mengikuti format Tabel terlampir

Mohon memeriksa kembali bagian teks yang lain. Jika ada perubahan kalimat atau tampilan yang tidak sesuai dengan maksud penulis, mohon konfirmasinya. Perbaikan naskah tersebut kami tunggu paling lambat hari senin 30 Januari 2012.

Edisi Desember 20... Page 1 of 7 [Navigation icons]

J. Agron. Indonesia 39 (3) : 174 - 180 (2011)

**Pengurangan Pemakaian Pupuk Anorganik dengan Penambahan Bokashi Serasah Tanaman pada Budidaya Tanaman Tomat**

*The Reduction of Inorganic Fertilizers Using The Addition of Plant Bokashi in the Tomato Cultivation*

Darwin Habinsaran Pangaribuan\*

Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia

Diterima 29 Juli 2011/Disetujui 28 Oktober 2011

**ABSTRACT**

*The aim of the research was to investigate the application of plant compost on the growth and yield of tomatoes. The experiment was conducted in Bandar Lampung from October 2009 until February 2010. The experimental design was completely randomized block design with 3 replications. The treatments were: control (P0); recommended inorganic fertilizers 135 kg N ha<sup>-1</sup>, 75 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>-1</sup>, and 110 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> (P1); white leadtree (Leucaena glauca) compost + recommended inorganic fertilizer (P2); legume compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P3); teak (Tectona grandis) compost + recommended inorganic fertilizer (P4); teak compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P5); paddy straw (Oryza sativa) compost + recommended inorganic fertilizer (P6); paddy straw compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P7); rattlepod (Crotalaria anagyroides) compost + recommended inorganic fertilizer (P8); rattlepod compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P9). Result of experiment showed that legume compost was the best compost among other plant composts. The application of 50% inorganic fertilizers combined with plant compost had the higher yield as compared to recommended inorganic fertilizer treatment. This implied that the use of plant compost could reduce the use of inorganic fertilizers while maintaining higher yield. The soil chemical properties was improved after application of plant compost.*

Keywords: inorganic fertilizer, plant compost, tomatoes

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi bokashi serasah tanaman pada pertumbuhan dan hasil tomat. Penelitian dilakukan di kebun petani, Bandar Lampung, sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2010. Perlakuan ditata dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Susunan perlakuan adalah kontrol (P0); pupuk anorganik rekomendasi 135 kg N ha<sup>-1</sup>, 75 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>-1</sup>, dan 110 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> (P1); bokashi lamtoro (Leucaena glauca) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P2); bokashi lamtoro 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P3); bokashi jati (Tectona grandis) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P4); bokashi jati 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P5); bokashi jerami padi (Oryza sativa) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P6); bokashi jerami padi*

Yth. Bapak Darwin H. Pamgaribuan

Kami telah melakukan beberapa koreksi pada naskah Bapak. Kami harap Bapak dapat memperbaiki dan memberi penjelasan pada beberapa komentar dalam naskah tersebut. Dalam file pdf yang kami kirimkan:

1. Tulisan berwarna merah merupakan catatan dari Editor dan diperbaiki atau diberi penjelasan.
2. Tulisan berwarna biru adalah pustaka yang sudah kami konfirmasi kebenarannya.

Kami mohon Bapak dapat menyampaikan penjelasan atau perbaikan mengikuti format Tabel di bawah ini:

Hal.	Komentar/ Pertanyaan	Tanggapan
174	<p>Result of experiment showed that <b>legume</b> compost was the best compost among other plant composts</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan hasil, maka kompos lamtoro dan jerami padi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.</li><li>• Apakah dapat ditulis: <i>Our results showed that rattlepod and paddy straw composts gave similar results in tomato growth and yield, and they were better than other plant composts tested.</i></li></ul>	
174	<p>This implied that the use of plant compost could reduce the use of inorganic fertilizers <b>while maintaining higher yield</b></p> <p>Apakah dapat ditulis: <i>...could reduce the use of inorganic fertilizers while maintaining higher yield than using inorganic fertilizers only.</i></p>	
174	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi <b>lamtoro</b> adalah bokashi yang terbaik di antara semua jenis bokashi serasah tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan hasil, maka kompos lamtoro dan jerami padi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.</li><li>• Apakah dapat ditulis: <i>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi lamtoro dan jerami padi memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan dan produksi tomat, dan kedua kompos tersebut lebih baik dibandingkan bokashi serasah tanaman lain yang diuji.</i></li></ul>	
174	<p>Hal ini berimplikasi bahwa penggunaan bokashi serasah tanaman dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan <b>hasil yang lebih tinggi</b></p> <p>Apakah dapat ditulis: <i>... dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan pupuk anorganik.</i></p>	
175	<p>Larutan ini kemudian siap diberikan pada campuran serasah tanaman (sesuai perlakuan) : bekatul : sekam padi (8:1:1) (<b>v:v?</b>)</p> <p>Rasio dalam volume (v:v) atau bobot (b:b)?</p>	
177	<p>Tanah penelitian menunjukkan reaksi netral dengan kandungan unsur hara makro N, P dan K yang rendah (<b>Winarso, 2005</b>)</p> <p>Apakah pustaka ini boleh dihapus?</p>	
179	<p>Hanafiah, K.A. 2005. Dasar-dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada, <b>tempat.</b></p> <p>Harap dilengkapi dengan lokasi penerbitannya</p>	

Mohon memeriksa kembali bagian teks yang lain. Jika ada perubahan kalimat atau tampilan yang tidak sesuai dengan maksud penulis, mohon konfirmasinya.

Atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

-----  
Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)  
Sebelumnya bernama Buletin Agronomi  
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Faperta, IPB  
Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  
Tel./fax: 0251 – 8629.353  
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalagronomi>

Yth. Bapak Darwin H. Pamgaribuan

Kami telah melakukan beberapa koreksi pada naskah Bapak. Kami harap Bapak dapat memperbaiki dan memberi penjelasan pada beberapa komentar dalam naskah tersebut. Dalam file pdf yang kami kirimkan:

1. Tulisan berwarna merah merupakan catatan dari Editor dan diperbaiki atau diberi penjelasan.
2. Tulisan berwarna biru adalah pustaka yang sudah kami konfirmasi kebenarannya.

Kami mohon Bapak dapat menyampaikan penjelasan atau perbaikan mengikuti format Tabel di bawah ini:

Hal.	Komentar/ Pertanyaan	Tanggapan
174	<p>Result of experiment showed that <b>legume</b> compost was the best compost among other plant composts</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan hasil, maka kompos lamtoro dan jerami padi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.</li><li>• Apakah dapat ditulis: <i>Our results showed that rattlepod and paddy straw composts gave similar results in tomato growth and yield, and they were better than other plant composts tested.</i></li></ul>	Terimakasih untuk sarannya, Kami menyetujui saran tersebut
174	<p>This implied that the use of plant compost could reduce the use of inorganic fertilizers <b>while maintaining higher yield</b></p> <p>Apakah dapat ditulis: <i>...could reduce the use of inorganic fertilizers while maintaining higher yield than using inorganic fertilizers only.</i></p>	Terimakasih untuk sarannya, dapat disetujui
174	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi <b>lamtoro</b> adalah bokashi yang terbaik di antara semua jenis bokashi serasah tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan hasil, maka kompos lamtoro dan jerami padi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya.</li><li>• Apakah dapat ditulis: <i>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi lamtoro dan jerami padi memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan dan produksi tomat, dan kedua kompos tersebut lebih baik dibandingkan bokashi serasah tanaman lain yang diuji.</i></li></ul>	Terimakasih untuk rekomendasinya. Kami setuju
174	<p>Hal ini berimplikasi bahwa penggunaan bokashi serasah tanaman dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan <b>hasil yang lebih tinggi</b></p> <p>Apakah dapat ditulis: <i>... dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan pupuk anorganik.</i></p>	Kami menyetujui saran Editor
175	<p>Larutan ini kemudian siap diberikan pada campuran serasah tanaman (sesuai perlakuan) : bekatul : sekam padi (8:1:1) (<b>v:v?</b>)</p> <p>Rasio dalam volume (v:v) atau bobot (b:b)?</p>	Dalam bobot
177	<p>Tanah penelitian menunjukkan reaksi netral dengan kandungan unsur hara makro N, P dan K yang rendah (<b>Winarso, 2005</b>)</p> <p>Apakah pustaka ini boleh dihapus?</p>	Ya, kami setuju
179	<p>Hanafiah, K.A. 2005. Dasar-dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada, <b>tempat.</b></p> <p>Harap dilengkapi dengan lokasi penerbitannya</p>	Sudah kami lengkapi

Mohon memeriksa kembali bagian teks yang lain. Jika ada perubahan kalimat atau tampilan yang tidak sesuai dengan maksud penulis, mohon konfirmasinya.

Atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

-----  
Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)  
Sebelumnya bernama Buletin Agronomi  
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Faperta, IPB  
Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680  
Tel./fax: 0251 – 8629.353  
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalagronomi>

**Pengurangan Pemakaian Pupuk Anorganik dengan Penambahan Bokashi Serasah Tanaman pada Budidaya Tanaman Tomat**

***The Reduction of Inorganic Fertilizers Using The Addition of Plant Bokashi in the Tomato Cultivation***

**Darwin Habinsaran Pangaribuan\***

Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia

Diterima 29 Juli 2011/Disetujui 28 Oktober 2011

**ABSTRACT**

The aim of the research was to investigate the application of plant compost on the growth and yield of tomatoes. The experiment was conducted in Bandar Lampung from October 2009 until February 2010. The experimental design was completely randomized block design with 3 replications. The treatments were: control (P0); recommended inorganic fertilizers 135 kg N ha<sup>-1</sup>, 75 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>-1</sup>, and 110 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> (P1); white leadtree (*Leucaena glauca*) compost + recommended inorganic fertilizer (P2); legume compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P3); teak (*Tectona grandis*) compost + recommended inorganic fertilizer (P4); teak compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P5); paddy straw (*Oryza sativa*) compost + recommended inorganic fertilizer (P6); paddy straw compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P7); rattlepod (*Crotalaria anagyroides*) compost + recommended inorganic fertilizer (P8); rattlepod compost + 50% recommended inorganic fertilizer (P9). Result of experiment showed that **legume** compost was the best compost among other plant composts. The application of 50% inorganic fertilizers combined with plant compost had the higher yield as compared to recommended inorganic fertilizer treatment. This implied that the use of plant compost could reduce the use of inorganic fertilizers **while maintaining higher yield**. The soil chemical properties was improved after application of plant compost.

Keywords: inorganic fertilizer, plant compost, tomatoes

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi bokashi serasah tanaman pada pertumbuhan dan hasil tomat. Penelitian dilakukan di kebun petani, Bandar Lampung, sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2010. Perlakuan ditata dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Susunan perlakuan adalah kontrol (P0); pupuk anorganik rekomendasi 135 kg N ha<sup>-1</sup>, 75 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ha<sup>-1</sup>, dan 110 kg K<sub>2</sub>O ha<sup>-1</sup> (P1); bokashi lamtoro (*Leucaena glauca*) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P2); bokashi lamtoro 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P3); bokashi jati (*Tectona grandis*) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P4); bokashi jati 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P5); bokashi jerami padi (*Oryza sativa*) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P6); bokashi jerami padi 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P7); bokashi orok-orok (*Crotalaria anagyroides*) 20 ton ha<sup>-1</sup> + pupuk anorganik rekomendasi (P8); bokashi orok-orok 20 ton ha<sup>-1</sup> + setengah pupuk anorganik rekomendasi (P9). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi **lamtoro** adalah bokashi yang terbaik di antara semua jenis bokashi serasah tanaman. Aplikasi setengah pupuk anorganik dikombinasikan dengan aneka pupuk bokashi serasah tanaman menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pupuk anorganik rekomendasi. Hal ini berimplikasi bahwa penggunaan bokashi serasah tanaman dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik seraya meningkatkan **hasil yang lebih tinggi**. Sifat kimia tanah juga diperbaiki setelah aplikasi bokashi serasah tanaman.

Kata kunci: bokashi serasah tanaman, tomat, pupuk anorganik

**PENDAHULUAN**

Aplikasi pupuk anorganik berlebihan pada budidaya sayuran adalah praktik yang kurang baik. Sumber daya lokal berupa serasah tanaman, seperti jerami padi (*Oryza*

*sativa* L.), tanaman dari famili Leguminosae, dan daun jati (*Tectona grandis*), dapat dijadikan alternatif sumber bahan organik. Jerami padi disamping memiliki kandungan unsur hara makro juga sebagai sumber unsur hara mikro. Tanaman kacang-kacangan dari famili Leguminosae seperti lamtoro (*Leucaena glauca*) dan orok-orok (*Crotalaria anagyroides*), memiliki pertumbuhan yang cepat, mampu beradaptasi dengan baik di tanah masam, produksi hijauannya cukup

\* E-mail: bungdarwin@yahoo.com

tinggi, dan dapat mengembalikan nitrogen ke dalam tanah. Jenis pupuk organik sangat beragam berdasarkan asal bahan terbentuknya. Bahan-bahan serasah tanaman dapat dibuat kompos agar menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Setiap bahan organik memiliki keunggulannya masing-masing dan memiliki pengaruh yang spesifik. Dalam percobaan ini, beberapa serasah tanaman diaplikasikan dalam bentuk kompos bokashi yang telah mengalami fermentasi dengan bioaktivator.

Penelitian tentang pengaruh bahan organik terhadap produksi seperti penelitian Neliyati (2006) dan Surawinata (2003), menunjukkan bahwa aplikasi bahan organik meningkatkan produksi tomat. Akan tetapi penelitian tersebut belum mengkaji apakah aplikasi bahan organik dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Penggunaan beberapa pupuk organik dapat mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik seperti aplikasi pupuk urea hayati pada bawang merah (Rosliani dan Hilman, 2002) dan aplikasi pupuk kotoran ayam yang difermentasi (porasi) pada kentang (Nurmayulis, 2005). Sampai sejauh ini belum ada informasi tentang apakah aplikasi bokashi berbasis serasah tanaman dapat mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik pada budidaya tomat.

Tujuan penelitian adalah mengkaji efektivitas bokashi jerami padi, lamtoro, orok-orok, dan daun jati terhadap pertumbuhan dan produksi tomat.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Natar mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2010. Analisis tanah dan kompos dilakukan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Bahan-bahan yang digunakan adalah benih tomat varietas Permata, jerami, daun jati, orok-orok, dan lamtoro yang diambil dari kebun petani sekitar lokasi penelitian, EM4, insektisida dan fungisida botani, pupuk urea (48% N), SP-36 (36%  $P_2O_5$ ), dan KCl (55%  $K_2O$ ).

Percobaan ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan. Susunan perlakuan yaitu:

$P_0$  = kontrol (tanpa pupuk);  $P_1$  = pupuk anorganik dosis rekomendasi (135 kg N  $ha^{-1}$ , 75 kg  $P_2O_5$   $ha^{-1}$ , dan 110 kg  $K_2O$   $ha^{-1}$ ) (Surawinata, 2003);  $P_2$  = bokashi lamtoro 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik dosis rekomendasi;  $P_3$  = bokashi lamtoro 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi;  $P_4$  = bokashi daun jati 20 ton  $ha^{-1}$  + dosis rekomendasi;  $P_5$  = bokashi daun jati 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi;  $P_6$  = bokashi jerami padi 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik dosis rekomendasi;  $P_7$  = bokashi jerami padi 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi;  $P_8$  = bokashi orok-orok 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik dosis rekomendasi;  $P_9$  = bokashi orok-orok 20 ton  $ha^{-1}$  + pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi

Uji F pada taraf  $\alpha = 5\%$  digunakan untuk menentukan pengaruh perlakuan. Apabila terdapat pengaruh nyata terhadap peubah yang diamati maka setiap perlakuan dibandingkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf  $\alpha = 5\%$ .

Bahan serasah tanaman yang digunakan (jerami padi, orok-orok, lamtoro, daun jati) dipotong kecil-kecil. Kemudian EM-4 diencerkan dengan konsentrasi 1 mL  $L^{-1}$  air dan molase 1 g  $L^{-1}$  air. Larutan ini kemudian siap diberikan pada campuran serasah tanaman (sesuai perlakuan) : bekatul : sekam padi (8:1:1) (v:v?). Campuran tersebut ditutup dengan menggunakan terpal. Suhu tumpukan bahan kompos dipertahankan 40 - 50 °C. Suhu dikontrol setiap hari dengan cara diaduk agar suhunya tidak tinggi. Kompos siap digunakan setelah didekomposisikan selama 3-4 minggu.

Benih tomat disemai dalam bedeng persemaian. Media disiapkan 1 minggu sebelum penyemaian benih. Media persemaian adalah campuran tanah : pupuk kandang sapi (2 : 1, v:v) yang telah diayak dengan ayakan pasir berdiameter 0.5 cm. Bibit siap dipindahtanamkan ke lapangan setelah berumur 28 hari setelah semai atau bibit yang telah memiliki 3-5 helai daun. Bibit yang akan ditanam di lahan dipilih yang baik, yaitu pertumbuhannya tegar, warna daun hijau, dan tidak terkena hama penyakit.

Pengolahan tanah dilakukan dua kali dengan menggunakan bajak, sisa tanaman, rumput, dan akar dibersihkan, lalu tanah diratakan dengan cangkul. Ukuran plot untuk setiap percobaan adalah 6 m  $\times$  4 m dengan jarak antar ulangan 1 m. Tomat ditanam dengan jarak tanam 50 cm  $\times$  60 cm sehingga jumlah populasi tomat per plot sebanyak 50 tanaman. Kapur dengan dosis 4 ton  $ha^{-1}$  diaplikasikan dua minggu sebelum tanam, untuk menetralkan kemasaman tanah menjadi pH 6.27. Pemupukan diberikan sesuai dengan perlakuan.

Gulma dikendalikan secara manual dengan menggunakan kored atau cangkul. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan memberikan biopestisida yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa ekstrak daun mimba, lengkuas dan serai dengan konsentrasi 1 L larutan diencerkan dengan 10 L air (Sarjan, 2004), berselang-seling setiap 1 minggu satu kali dengan pestisida komersial sesuai dengan rekomendasi. Untuk mengendalikan hama alat buah penyebab busuk buah, dipasang perangkap yang diberi Antraxtan. Panen dilakukan jika buah sudah sampai pada fase semburat (*breaker stage*).

Variabel yang diamati pada fase vegetatif dan generatif adalah tinggi tanaman (cm) pada umur 55 hari setelah tanam (HST), bobot kering brangkas (g) yaitu bobot kering batang, akar, dan daun pada umur 56 HST, diameter buah (cm), jumlah buah per petak panen, produksi bobot buah total per petak (kg petak $^{-1}$ ), produksi buah layak jual (kg petak $^{-1}$ ), persentase buah yang mengalami *blossom-end rot* (BER) per tanaman, kadar gula ( $^{\circ}$ Brix) diukur dengan *refractometer*, dan kadar asam (%) dengan metode titrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil analisis tanah sebelum percobaan disajikan dalam Tabel 1. Tanah lokasi penelitian menunjukkan tingkat kemasaman netral 6.01, dengan nisbah C/N yang relatif rendah, yaitu 9 (Hanafiah, 2005). Tabel 2 menyajikan hasil

Tabel 1. Hasil analisis tanah awal sebelum pengolahan tanah\*

Nama unsur		Kriteria**
pH H <sub>2</sub> O (1:2.5)	6.01	Netral
pH KCl (1:2.5)	5.67	-
N (%) Kjeldahl	0.14	Rendah
P Bray <sup>-1</sup> (ppm)	4.67	Rendah
K (me 100 g <sup>-1</sup> )	0.27	Rendah
C (%) Walkley & Black	1.50	Rendah
KTK (me 100 g <sup>-1</sup> )	9.57	Rendah
Nisbah C/N	9.00	Rendah
Tekstur (%)		
Pasir	25.78	Lempung berliat
Debu	26.14	
Liat	48.08	

Keterangan: \* = analisis tanah dilakukan di Laboratorium Tanah FP Unila; \*\* = menurut Balai Penelitian Tanah (2005)

analisis kompos tanaman sebelum aplikasi di lapangan. Kematangan kompos dapat dilihat dari kandungan karbon dan nitrogen atau nisbah C/N. Bahan organik bokashi dalam penelitian ini menunjukkan nilai C/N rasio yang beragam. Nilai C/N ratio daun lamtoro, orok-orok, dan jerami padi menunjukkan kisaran nilai 10 yang berarti bokashi tersebut

sudah matang. Nisbah C/N bokashi daun jati cukup tinggi (18) yang berarti proses dekomposisi bokashi daun jati berlangsung lebih lambat. Kandungan unsur-unsur makro seperti N, P, dan K pada semua bokashi menunjukkan nilai yang bervariasi. Bokashi daun lamtoro mengandung nilai N yang paling tinggi disusul dengan bokashi daun orok-orok. Bokashi daun orok-orok kaya akan unsur P dan K dibandingkan bokashi lainnya. Bokashi daun jati mengandung sedikit unsur hara makro (Tabel 2).

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa aplikasi bahan organik serasah tanaman berpengaruh nyata terhadap hampir semua variabel pengamatan, yaitu tinggi tanaman, bobot berangkasan kering, produksi tanaman, jumlah buah per tanaman, diameter, buah layak jual, persentase busuk ujung buah, dan kadar brix tomat (Tabel 3).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bokashi serasah tanaman meningkatkan tinggi tanaman, kapasitas *sink* tanaman (diameter dan jumlah buah) dibandingkan tanpa bokashi (kontrol) bahkan dibandingkan dengan perlakuan pupuk anorganik. Tanaman tomat dengan pemberian bokashi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian bokashi. Buah tomat dengan penambahan bokashi lebih besar ukurannya, dan jumlah buah per tanaman lebih banyak jumlahnya. Diameter buah tomat dan jumlah buah per tanaman antara perlakuan bokashi ditambah pupuk anorganik dosis penuh dan bokashi plus pupuk anorganik setengah dosis tidak berbeda nyata (Tabel 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bokashi serasah tanaman meningkatkan rata-rata lebih dari 65%

Tabel 2. Hasil analisis kompos serasah tanaman sesudah proses pengomposan

Jenis Bokashi	N (%)	P (%)	K (%)	pH (1:2.5)		C-organik (%)	C/N
				H <sub>2</sub> O	KCl		
Daun lamtoro	2.94	0.09	0.82	7.67	6.50	34.03	11.57
Daun orok-orok	2.17	0.25	0.10	8.01	7.80	22.84	10.53
Jerami padi	1.83	0.12	0.59	7.95	7.22	18.41	10.06
Daun jati	1.19	0.11	0.43	7.70	6.45	21.82	18.34

Tabel 3. Rangkuman hasil analisis ragam dan koefisien keragaman pengaruh berbagai bahan organik serasah tanaman terhadap variabel pengamatan

Parameter	F hitung dan signifikansi	Koefisien keragaman (KK) (%)
Tinggi tanaman 5 MST	12.36 **	11.08
Bobot kering 5 MST	18.13 **	15.35
Jumlah buah per tanaman	21.43 **	8.32
Diameter buah	17.70 **	3.35
Produksi	43.10 **	9.21
Buah layak Jual	34.14 **	11.80
Busuk ujung buah (BER)	11.01 **	17.36
Kandungan gula buah	8.58 **	2.94
Kadar asam	1.81 tn	19.73

Keterangan: \*\* = berbeda sangat nyata; tn = tidak berbeda nyata



Tabel 4. Bobot kering, diameter, dan jumlah buah per tanaman berbagai perlakuan bokashi serasah tanaman

Perlakuan	Tinggi tanaman (cm)	Bobot kering (g)	Diameter (cm)	Jumlah buah per tanaman
P0 = kontrol	35.2e	2.05b	3.37b	21.00c
P1 = pupuk anorganik dosis rekomendasi	38.2d	1.22b	3.59b	22.67c
P2 = bokashi lamtoro + dosis rekomendasi	58.4a	9.80a	4.28a	44.97a
P3 = bokashi lamtoro + ½ dosis rekomendasi	57.3a	8.83a	4.33a	46.67a
P4 = bokashi daun jati + dosis rekomendasi	52.0c	8.73a	4.09a	36.00b
P5 = bokashi daun jati + ½ dosis rekomendasi	54.40bc	8.30a	4.26a	36.20b
P6 = bokashi jerami padi + dosis rekomendasi	58.67a	8.33a	4.29a	44.89a
P7 = bokashi jerami padi + ½ dosis rekomendasi	58.20a	7.13a	4.35a	45.67a
P8 = bokashi orok-orok + dosis rekomendasi	54.43bc	6.67a	4.20a	36.00b
P9 = bokashi orok-orok + ½ dosis rekomendasi	54.50bc	6.95a	4.28a	36.17b
BNJ (5%)	2.05	4.09	0.40	8.67

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf  $\alpha = 5\%$

produksi buah tanaman tomat per petak dan buah layak jual (Tabel 5) dibandingkan tanpa bokashi (kontrol) bahkan dibandingkan dengan perlakuan pupuk rekomendasi. Contohnya, perlakuan P3 (aplikasi bokashi lamtoro + ½ dosis rekomendasi) meningkatkan produksi tomat 92.16% dan 103.5% buah layak jual lebih tinggi daripada perlakuan P1 (pupuk anorganik dosis rekomendasi). Produksi buah tomat per petak dan produksi buah layak jual antara perlakuan bokashi plus pupuk anorganik dosis penuh dengan bokashi plus pupuk anorganik setengah dosis tidak berbeda nyata pada semua jenis perlakuan bokashi serasah tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bokashi serasah tanaman meningkatkan kandungan gula buah tomat, dan nyata menurunkan persentase buah yang terserang busuk pangkal buah (BER) dibandingkan tanpa bokashi

(kontrol) bahkan dibandingkan dengan perlakuan pupuk anorganik (Tabel 6). Kandungan asam tidak dipengaruhi oleh perlakuan bokashi serasah tanaman. Persentase buah yang terserang BER dan kandungan gula buah antara perlakuan bokashi plus pupuk anorganik dosis penuh dengan bokashi plus pupuk anorganik setengah dosis tidak berbeda nyata.

**Pembahasan**

Kondisi tanaman selama penelitian secara umum tumbuh sehat dan baik. Tanah penelitian menunjukkan reaksi netral dengan kandungan unsur hara makro N, P dan K yang rendah (Winarso, 2005) (Tabel 1). Analisis nisbah C/N bahan organik yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bokashi lamtoro, orok-orok dan jerami

Tabel 5. Data produksi buah dan produksi buah layak jual berbagai perlakuan bokashi serasah tanaman

Perlakuan	Produksi (kg petak <sup>-1</sup> )	Selisih dari P1 (%)	Buah layak jual (kg petak <sup>-1</sup> )	Selisih dari P1 (%)
P0 = kontrol	7.83c	- 46.62	5.36a	- 55.88
P1 = pupuk anorganik dosis rekomendasi	14.67b	0	12.15b	0
P2 = bokashi lamtoro + dosis rekomendasi	25.37a	72.94	21.51c	77.03
P3 = bokashi lamtoro + ½ dosis rekomendasi	28.19a	92.16	24.73c	103.5
P4 = bokashi daun jati + dosis rekomendasi	19.26b	31.28	16.09b	32.43
P5 = bokashi daun jati + ½ dosis rekomendasi	19.46b	32.65	16.02b	31.85
P6 = bokashi jerami padi + dosis rekomendasi	24.80a	69.05	21.53c	77.20
P7 = bokashi jerami padi + ½ dosis rekomendasi	24.58a	67.55	22.53c	85.43
P8 = bokashi orok-orok + dosis rekomendasi	16.11b	9.82	13.22b	8.80
P9 = bokashi orok-orok + ½ dosis rekomendasi	17.49b	19.22	14.79b	21.72
BNJ (5%)	4.90		5.34	

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf  $\alpha = 5\%$

Tabel 6. Data serangan BER, kandungan gula brix dan kandungan asam pada berbagai perlakuan bokashi serasah tanaman

Perlakuan	BER (%)	Kandungan gula ( $^{\circ}$ Brix)	Asam (%)
P0 = kontrol	11.55a	5.56d	0.43
P1 = pupuk anorganik dosis rekomendasi	10.96a	5.78cd	0.68
P2 = bokashi lamtoro + dosis rekomendasi	5.88b	6.27abc	0.64
P3 = bokashi lamtoro + $\frac{1}{2}$ dosis rekomendasi	4.56b	6.62a	0.50
P4 = bokashi daun jati + dosis rekomendasi	5.81b	5.99bcd	0.54
P5 = bokashi daun jati + $\frac{1}{2}$ dosis rekomendasi	5.76b	6.08abc	0.44
P6 = bokashi jerami padi + dosis rekomendasi	7.27b	6.38ab	0.51
P7 = bokashi jerami padi + $\frac{1}{2}$ dosis rekomendasi	5.71b	6.28abc	0.48
P8 = bokashi orok-orok + dosis rekomendasi	5.02b	6.27abc	0.58
P9 = bokashi orok-orok + $\frac{1}{2}$ dosis rekomendasi	5.77b	6.24abc	0.52
BNJ (5%)	3.62	0.529	0.307 tn

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf  $\alpha = 5\%$

padi mempunyai C/N sekitar 10, sedangkan bokashi daun jati memiliki nilai C/N 18, yang menunjukkan bahwa semua bokashi telah siap diaplikasikan. Nisbah C/N kompos yang stabil antara 10 sampai 30 (Hanafiah, 2005). Winarso (2005) melaporkan bahwa dari segi penyediaan hara maka bahan organik dengan nisbah C/N rendah dikatakan bermutu tinggi karena lebih mudah terdekomposisi dan cepat menyediakan hara tanpa menimbulkan immobilisasi hara.

Pemberian bokashi serasah tanaman nyata meningkatkan produksi buah tomat. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada aneka tanaman sayuran seperti tomat (Togun dan Akanbi, 2003; Neliyati, 2006), buncis (Koesrini dan William, 2009), bawang merah (Mayun, 2007), kentang (Danilchenko *et al.*, 2005), cabai (Sutari *et al.*, 2003) dan sayuran daun (Iskandar, 2003). Hal ini disebabkan pemberian bokashi dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik merupakan perekat butiran lepas atau bahan pemantap agregat, sebagai sumber hara tanaman dan sumber energi dari sebagian besar organisme tanah. Bahan organik dapat membantu akar tanaman menembus tanah lebih dalam dan luas sehingga tanaman lebih kokoh dan lebih mampu menyerap unsur hara dan air dalam jumlah banyak (Gonzalez dan Cooperband, 2002).

Bokashi berbasis serasah tanaman lamtoro dan jerami terbukti memberikan produksi tomat total dan tomat layak jual lebih tinggi daripada perlakuan lainnya, yaitu aplikasi bokashi lamtoro + pupuk anorganik dosis penuh (P2) atau bokashi lamtoro + pupuk anorganik setengah dosis (P3) atau bokashi jerami + pupuk anorganik dosis penuh (P6) atau bokashi jerami + pupuk anorganik setengah dosis (P7) (Tabel 5). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian pupuk anorganik setengah dosis rekomendasi yang dikombinasikan dengan aplikasi bokashi berbasis serasah tanaman (lamtoro atau jerami padi) efektif meningkatkan pertumbuhan dan produksi tomat. Ini berarti bahwa aplikasi bahan organik dapat meningkatkan efisiensi pupuk

anorganik. Fakta ini bersesuaian dengan hasil penelitian Widowati (2009) pada tanaman caisim yang menemukan bahwa efisiensi NPK meningkat dengan penerapan pupuk organik. Menurut Pramono (2004) pengelolaan bahan organik merupakan tindakan perbaikan lingkungan tumbuh tanaman yang antara lain dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, sedangkan menurut Muliana *et al.* (2005) aplikasi bahan organik asal dari tumbuhan *Crotalaria* sp dan *Calotropis* sp dapat memperbaiki sifat kimia tanah.

Aplikasi pupuk anorganik dosis rekomendasi belum tentu memperbaiki rhizosfer tanah, bahkan pemberian pupuk pada dosis tinggi diduga merugikan kehidupan mikroba yang terdapat pada rhizosfer yang berperan dalam penyediaan hara. Morgan *et al.* (2005) menunjukkan bahwa pemberian pupuk anorganik pada dosis tinggi dapat menurunkan populasi dan keragaman mikroba, sehingga mikroba yang berperan dalam mineralisasi senyawa organik akan berkurang populasinya.

Hasil penelitian menunjukkan produksi tomat dan produksi tomat layak jual pada aplikasi bokashi lamtoro nyata lebih tinggi daripada pada aplikasi bokashi orok-orok atau bokashi daun jati. Hal ini disebabkan oleh perbedaan unsur hara yang dikandung bahan organik tersebut dan ketersediaannya bagi tanaman. Bokashi lamtoro kaya unsur hara N, P, dan K, terutama kaya kandungan N, dengan tingkat ketersediaan yang lebih tinggi dibanding bokashi daun jati. Unsur-unsur hara tersebut dibutuhkan untuk pembentukan komponen hasil dan peningkatan hasil tanaman tomat. Penelitian Palimbungan *et al.* (2006) juga menunjukkan bahwa pupuk cair daun lamtoro dapat meningkatkan produksi tanaman sawi. Produksi tomat pada perlakuan bokashi lamtoro dengan bokashi jerami padi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, hal ini menunjukkan bahwa, selain bokashi orok-orok, bokashi jerami padi juga efektif sebagai sumber bahan organik berbasis serasah tanaman. Bahan organik jerami padi dapat memperbaiki sifat biologi tanah

sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik bagi perakaran tanaman. Selain itu bahan organik jerami padi dapat mensuplai unsur hara terutama K. Jerami padi secara tidak langsung mengandung N dan C yang menyediakan substrat untuk metabolisme jasad renik.

Hasil yang lebih tinggi pada perlakuan semua jenis bokashi daripada perlakuan kontrol atau perlakuan pupuk anorganik dosis penuh rekomendasi, ditunjang oleh fakta bahwa tinggi tanaman, diameter buah dan jumlah buah juga meningkat pada perlakuan aplikasi semua jenis bokashi. Selain itu perlakuan semua jenis bokashi nyata menurunkan persentase buah yang terserang gangguan *blossom-end-rot* (Tabel 6). Meningkatnya diameter buah dan jumlah buah menunjukkan bahwa alokasi asimilat ke bagian *sink* tanaman yaitu bagian buah berjalan efektif sebagai akibat pemberian pupuk bokashi. Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa jumlah asimilat (yang dinyatakan dalam bobot kering tanaman) nyata lebih tinggi pada perlakuan semua jenis bokashi daripada kontrol atau pupuk anorganik. Berkurangnya persentase buah yang terserang penyakit busuk ujung buah, diduga bahwa aplikasi bokashi memperbaiki ketahanan tanaman terhadap penyakit, termasuk gangguan busuk pangkal buah. Morgan *et al.* (2005) mengemukakan bahwa pemberian bahan organik akan memperbaiki rhizosfer yang dapat menjaga siklus hara melalui produksi hormon, membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit dan membantu toleransi tanaman terhadap senyawa toksik.

Pada umumnya, aplikasi bokashi semua serasah tanaman yang disertai dengan penambahan pupuk anorganik dosis penuh atau setengah dosis nyata meningkatkan kandungan gula buah tomat dibandingkan dengan perlakuan kontrol atau perlakuan aplikasi pupuk anorganik saja (Tabel 6). Hal ini diduga karena dengan semakin membaiknya struktur tanah akibat bokashi akan memperbaiki proses metabolisme tanaman sehingga meningkatkan kandungan asimilat tanaman yang selanjutnya dapat meningkatkan kandungan gula. Aplikasi bokashi tidak meningkatkan kandungan asam buah tomat (Tabel 6), diduga kandungan asam buah tomat adalah sifat bawaan genetik dari varietas tomat yang ditanam.

### KESIMPULAN

Bahan organik berbasis serasah tanaman dapat digunakan sebagai pupuk alternatif karena mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tomat lebih tinggi daripada perlakuan pupuk anorganik dosis penuh.

Aplikasi bokashi lamtoro atau bokashi jerami dikombinasikan dengan pupuk anorganik setengah dosis pupuk anorganik anjuran dapat diterapkan guna penghematan penggunaan pupuk anorganik.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ditjen Dikti yang telah membiayai penelitian ini melalui program Hibah Strategis Batch 1 Penguasaan Teknologi Unila. Terimakasih atas kerjasama yang baik dengan Yafizham, Hidayat Pujisiswanto, Okta dan Lisma.

### DAFTAR PUSTAKA

- Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis: Analisis Kimia Tanah. Edisi Pertama. Bogor.
- Danilchenko, V., R. Dris, R. Niskanen. 2005. Influence of organic and mineral fertilization on yield, composition and processing quality of potatoes. J. Food Agric. Environ. 3:143-144.
- Gonzalez, R.F., L.R. Cooperband. 2002. Compost effects on soil physical properties and field nursery production. Compost Sci. Util. 10:226-237.
- Hanafiah, K.A. 2005. Dasar-dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada, *tempat*.
- Iskandar, S. 2003. Pengaruh perlakuan bokashi terhadap produktivitas tanaman sayuran dalam kegiatan pertanian organik. J. Agrotropika 8:6-10.
- Koesrini, E. William. 2009. Pengaruh bahan amelioran terhadap pertumbuhan dan hasil tiga varietas buncis di atas sistem surjan pada lahan sulfat masam potensial. J. Agron. Indonesia 37:34-39.
- Mayun, I.A. 2007. Efek mulsa jerami padi dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah di daerah pesisir. Agritrop 26:33-40.
- Morgan, J.A.W., G.D. Bending, P.J. White. 2005. Biological costs and benefits to plant-microbe interactions in the rhizosphere. J. Exp. Bot. 56:1729-1739.
- Muliana, Sufardi, N. Akhmad. 2005. Pemanfaatan *Crotalaria sp*, *Calotropis gigantean* dan residunya sebagai pupuk organik alternatif: Perbaikan beberapa sifat kimia tanah. J. Agrista 9:26-35.
- Neliyati. 2006. Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada beberapa dosis kompos sampah kota. J. Agron. 10:93-97.
- Nurmayulis. 2005. Hasil tanaman kentang (*Solanum tuberosum*L.) akibat pemberian porasi *Azospirillum sp.* dan pupuk nitrogen pada Andisols Pengalengan. J. Agrista 9:216-224.
- Palimbangan, N., R. Labatar, F. Hamzah. 2006. Pengaruh ekstrak daun lamtoro sebagai pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. J. Agrisistem 2:96-101.
- Pramono, J. 2004. Kajian penggunaan bahan organik pada padi sawah. Agrosains 6:11-14.
- Roslani, R., Y. Hilman. 2002. Pengaruh pupuk urea hayati dan pupuk organik penambat nitrogen terhadap

- pertumbuhan dan hasil bawang merah. *J. Hortikultura* 12:17-27.
- Sarjan, M., 2004. Pengelolaan hama terpadu dalam perspektif sistem pertanian berkelanjutan di era globalisasi. Orasi ilmiah dies natalis Unram. Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Surawinata, E.T. 2003. Pengaruh berbagai kombinasi pupuk organik asal TPA Bantargebang dan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat varietas Arthaloka. *J. Agrikultura* 14:139-144.
- Sutari, W., D. Sobardini, A. Wahyudin. 2003. Pengaruh dosis pupuk kandang dan konsentrasi effective microorganism (EM4) terhadap pertumbuhan dan hasil cabe kultivar Hot Beauty. *J. Agrikultura* 14:106-112.
- Togun, A.O., W.B. Akanbi. 2003. Comparative effectiveness of organic-based fertilizer to mineral fertilizer on tomato growth and fruit yield. *Compost Sci. Util.* 11:337-342.
- Widowati, L.R. 2009. Peranan pupuk organik terhadap efisiensi pemupukan dan tingkat kebutuhannya untuk tanaman sayuran pada tanah Inseptisols Ciherang, Bogor. *J. Tanah Tropika* 14:221-228.
- Winarso, S. 2005. Kesuburan Tanah. Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.